

вовсе не подходит. Поэтому я предостерегаю отъ пользованія этой частью діагноза. Что касается большей блѣдности окраски вообще, особенно верхней стороны тѣла, то долженъ сказать, что подобныя же, нѣсколько болѣе блѣдныя птицы попадаются не только въ Туркестанѣ и Ц. Азіи, но и въ другихъ частяхъ области распространенія вида. Я расположилъ весь нашъ матеріалъ строго географически и пришелъ къ убѣжденію, что *C. diluta* не заслуживаетъ выдѣленія даже въ качествѣ подвида. Оттѣнокъ цвѣта верхней стороны тѣла нѣсколько варьируетъ повсюду, завися главнымъ образомъ отъ большей или меньшей степени обнашиванія блѣдныхъ ободковъ перьевъ у взрослыхъ птицъ. Такъ, наши птицы изъ Южно-Уссурійскаго края, которыхъ ШНАУРЕ считаетъ за «absolutely typical *C. riparia*», сохранили сѣроватые ободки и вслѣдствіе этого очень блѣдны.

#### 167. *Chelidon urbica* (LINN.).

3480'. ♀ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.

«Гнѣздится у станицы Алтайской сравнительно въ небольшомъ числѣ».

Область распространенія *Ch. urbica* обыкновенно приводится невѣрно; такъ, даже въ «A monograph of the *Hirundinidae* or family of Swallows» ШНАУРЕ'а и УУАТТ'а. На прилагаемой къ этому сочиненію картѣ распространенія *Ch. urbica* она не показана для Лапландіи, гдѣ она несомнѣнно, хотя и рѣдко, гнѣздится, а восточная граница, проведенная по Уральскому хребту, восточному берегу Аральскаго озера, Аму-дарьѣ до Восточнаго Туркестана и сѣверо-западнаго конца Гималаевъ, совершенно невѣрна въ своей сѣверной части, такъ какъ исключаетъ всю западную Сибирь, Русскій Туркестанъ и сѣверо-западную Монголію, гдѣ *Ch. urbica* безусловно встрѣчается. Точнѣе восточная граница этого вида намѣчается по нашимъ матеріаламъ слѣдующимъ образомъ.

Къ сожалѣнію изъ сѣверной части западной Сибири въ нашемъ музеѣ вовсе нѣтъ экземпляровъ рода *Chelidon*; подь 64° с. ш. у Кондинскаго монастыря близъ Березова на Оби наблюдала колонию вѣроятно этого вида экспедиція Бременскаго Географическаго Общества подь начальствомъ FINSCH'а<sup>1)</sup>, а подь 62°40' с. ш. въ Холопанскихъ юртахъ единственнй разъ за все время пребыванія на нижнемъ теченіи Оби видѣлъ его К. М. Дерюгинъ<sup>2)</sup>; ни упомянутая экспедиція, ни К. М. Дерюгинъ не добыли

1) Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, XXIX, 1880, p. 152.

2) Тр. Спб. Общ. Ест., XXIX, 1898, p. 102.