

экземпляровъ. Для нижняго теченія Енисея къ сѣверу до $69^{\circ}30'$ с. ш. приводитъ этотъ видъ со знакомъ вопроса MEVES¹⁾, но у насъ нѣтъ и тутъ никакого ручательства въ томъ, что наблюденіе было сдѣлано правильно, такъ какъ экземпляровъ ТНЭЕЛ не привезъ. СЕЕВОНМ²⁾ категорически заявляетъ, что на Енисеѣ (отъ Енисейска до 69°) онъ встрѣчалъ только *Ch. lagopoda*, но не *Ch. urbica*, а на р. Нижней Тунгузкѣ Чекановскій добылъ 21. VI тоже *Ch. lagopoda*. Въ бассейнѣ верхняго теченія Енисея живетъ однако несомнѣнно *Ch. urbica*. Чекановскій доставилъ въ нашъ музей экземпляръ изъ села Падунъ на р. Верхней Тунгузкѣ еще въ предѣлахъ Иркутской губ.; въ коллекціи Н. А. Сѣверцова есть экземпляръ изъ Иркутска; П. П. Сушкинъ³⁾ собиралъ этотъ видъ въ Саянахъ, именно въ Бараксанѣ или Мигнѣ въ Минусинскомъ округѣ (♂, 18. VI. 1902). Въ сѣверо-западной Монголіи его добыли въ Улясутаѣ и М. М. Березовскій (♂, 25. IV. 1877), и препараторъ Коломейцевъ, примкнувшій къ экспедиціи Г. Н. Потанина. Въ центральномъ Тянь-шанѣ его собиралъ въ маѣ на Юлусѣ Н. М. Пржевальскій. Изъ Восточнаго Туркестана въ нашемъ музеѣ хранятся три экземпляра, именно самецъ изъ хребта Русскаго (зап. Куэнь-лунь), добытый Н. М. Пржевальскимъ въ маѣ, и два самца, съ Таушканъ-дарьи и изъ оазиса Нии, собранные экспедиціей Пѣвцова въ апрѣлѣ. Относительно Памировъ Н. А. Сѣверцовъ⁴⁾ пишетъ: «во второй половинѣ августа наблюдался безостановочный пролетъ... стайками». Всѣ экземпляры *Chelidon* изъ Русскаго Туркестана самые типичные *Ch. urbica*, а не *Ch. lagopoda*, какъ упоминаетъ въ своихъ спискахъ Сѣверцовъ. Несомнѣнно эта ошибка и вводила въ заблужденіе западныхъ орнитологовъ, заставляя ихъ исключать эту страну изъ области распространенія *Ch. urbica*. Въ горныхъ странахъ узла, соединяющаго Гинду-кушъ съ Гималаями, *Ch. urbica* встрѣчается съ *Ch. caschmiriensis*. По ОАТЕС'у⁵⁾ въ Гильгитѣ живутъ оба вида, причемъ SCULLY и BIDDULPH нашли тутъ *Ch. urbica* въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ, т. е. гнѣздящейся. По ту сторону Инда ОАТЕС приводитъ *Ch. urbica* для Nazara и Mussoogee — самое восточное мѣсто-нахожденіе этого вида въ сѣверо-западныхъ Гималаяхъ. Точное распределеніе его по Индостану ОАТЕС затрудняется привести въ виду трудности отличія *Ch. urbica* и *Ch. caschmiriensis* въ плоскихъ шкуркахъ. Несомнѣнно однако, что *Ch. urbica* тутъ не только зимуетъ, но и гнѣздится. Въ рукахъ

1) Öfvers. Kongl. Vetensk.-Akad. Förhandl., 1879, № 6, p. 38.

2) Ibis, 1879, p. 17.

3) Bull. Brit. Orn. Cl., XIV, 1904, p. 46.

4) Зап. Туркест. Отд. Общ. Люб. Естествозн., I, 1879, p. 78; Ibis, 1883, p. 70.

5) Faun. Brit. Ind., Birds, II, p. 269.