

Оатес'а были экземпляры изъ Khandesh'а (ноябрь), изъ Shimoga въ Mysore (линяющій въ апрѣлѣ, а гнѣздованіе наблюдалось въ маѣ) и изъ Coimbatore (январь); наконецъ JERDON упоминаетъ этотъ видъ для Nilgiris (мартъ).

Область распространенія *Ch. lagopoda* начинается на сѣверѣ отъ Енисея, гдѣ ее прослѣдилъ СЕЕВОИМ, какъ уже сказано, отъ Енисейска до устья Курейки подъ полярнымъ кругомъ и далѣе до 69° сѣв. шир., а РОРНАМ<sup>1)</sup> до 69°40' с. ш., и простирается до Земли Чукчей (экз. Майделя) и Камчатки (PALLAS) На этомъ пространствѣ она была добыта Чекановскимъ въ деревнѣ Ербохогонъ на р. Нижней Тунгузкѣ 21. VI, докторомъ А. А. Бунге на Янѣ 22. VI. 1885, экспедиціей Черскаго на Колымѣ 7 по 19. VII. 1892. Въ Забайкальѣ ее собралъ у Нерчинска 25. IV. 1855 Маакъ, а въ Кулусутаевскѣ 9. V. 1856 — Радде. Въ сѣверо-западной Монголіи ее нашелъ препараторъ Коломейцевъ съ одной стороны на рѣкѣ Шири, притокѣ р. Байдарикъ, впадающей въ озеро Цаганъ-норъ (♂, 30. VI), а съ другой на рѣкѣ Яматы, притокѣ р. Эдеръ системы верхней Селенги (♂ 22. VI). Западная граница этого вида приблизительно намѣчается, такимъ образомъ, въ Сибири нижнимъ и среднимъ теченіемъ Енисея, а въ сѣверной Монголіи водораздѣломъ между верховьями Оби и Енисея. Къ востоку отъ этой границы *Ch. lagopoda* населяетъ всю сѣверо-восточную Азію къ югу до центральныхъ провинцій Китая и Мупина въ Сы-чуани; въ Японіи ея нѣтъ, а въ прибрежной полосѣ Китая она встрѣчается повидимому лишь въ качествѣ залетной птицы: СТУАН<sup>2)</sup> упоминаетъ только объ одномъ экземплярѣ, хранящемся въ Шанхайскомъ музеѣ. Повидимому не болѣе какъ случайно появляется она зимою и въ Британской Бурмѣ, откуда извѣстенъ только одинъ экземпляръ изъ Moulmein'а. Оатесъ говоритъ, что онъ нерѣдко наблюдалъ большія стаи *Chelidon* въ южномъ Пегу и полагаетъ, что это былъ этотъ видъ; такъ какъ Оатесъ не добылъ экземпляровъ, то опредѣленіе это остается сомнительнымъ, судя же по географическому распространенію *Ch. caschmiriensis* стаи эти могли состоять и изъ этого послѣдняго вида.

Отличіе *Ch. urbica* отъ *Ch. lagopoda* очень рѣзко; у первой вилка хвоста много глубже, а самыя длинныя изъ верхнихъ кроющихъ хвоста темныя — у молодыхъ бурья, у старыхъ черныя съ синимъ блескомъ; у *Ch. lagopoda* вилка хвоста значительно короче, а всѣ кроющія хвоста либо сплошь бѣлы, либо самыя длинныя изъ нихъ въ большей части бѣлы. Я

1) Ibis, 1898, p. 501.

2) Ibis, 1891, p. 351.