

имѣю экземпляры, у которыхъ послѣднія ближе къ основанію буры или черны, тѣмъ не менѣе опредѣленіе ихъ не представляетъ ни малѣйшихъ затрудненій: у *Ch. urbica* самыя длинныя изъ верхнихъ кроющихъ хвоста всегда одноцвѣтны съ рулями и не выдѣляются на фонѣ этихъ послѣднихъ.

168. *Chelidon caschmiriensis* GOULD.

12.860'. ♂ adlt., 2 pull., 29. VII. 1900, р. И-чю, правый прит. Ды-чю или верхняго теченія Голубой рѣки.

Длина крыла ♂ равняется 100 mm. (3.90").

«Этотъ видъ былъ довольно обыкновененъ на абсолютной высотѣ 12.—13.000'; онъ гнѣзился въ скалахъ, но не высоко отъ земли и воды. въ концѣ іюля мѣсяца гнѣзда содержали птенцовъ» на взлетѣ.

Область распространенія этого вида простирается отъ Ладака, Гильгита и Кашмира по всему протяженію Гималаевъ и восточной окраины Тибета до Нань-шаня и Ала-шаня на сѣверѣ и до сѣверо-западной части провинціи Фу-цзянь (Fo-kien) на югѣ. Тутъ ее нашель въ послѣднее время LA TOUSNE¹⁾ близъ Kuatun'a; П. К. Козловъ доставилъ вышеприведенные экземпляры съ верховьевъ Голубой рѣки въ юго-восточномъ Тибетѣ (Камъ), а Н. М. Пржевальскій наблюдалъ ее въ большомъ количествѣ какъ въ центральномъ Нань-шанѣ, такъ и въ хребтѣ Ала-шань. Кромѣ того Н. М. Пржевальскій²⁾ высказываетъ предположеніе, что *Ch. caschmiriensis* гнѣздится на хребтѣ Хара-норинъ-ула, но утверждаетъ, что въ хребтѣ Муни-ула ея нѣтъ; «въ юго-восточной Монголіи замѣчена», будто-бы, «въ маломъ количествѣ только на весеннемъ пролетѣ въ началѣ мая». Ни изъ Хара-норинъ-ула, ни изъ юго-восточной Монголіи въ коллекціи Пржевальскаго экземпляровъ нѣтъ и, судя по распространенію видовъ *Chelidon*, много вѣроятнѣе, что и тутъ, и тамъ живетъ уже *Ch. lagopoda*, которую DAVID³⁾ наблюдалъ гнѣздящейся въ горахъ къ востоку отъ Пекина. Пролетъ куда то на сѣверъ, гдѣ *Ch. caschmiriensis* уже не водится, для послѣдней вообще невозможенъ, а для *Ch. lagopoda* весьма понятенъ.

Ch. caschmiriensis очень близка къ *Ch. urbica* и отличать съ полной увѣренностью возможно только взрослыхъ птицъ, у которыхъ хвостъ отросъ уже окончательно, такъ какъ главный дифференціальный признакъ представляетъ выемка хвоста. У *Ch. urbica* послѣдняя много глубже, такъ что разстояніе между концами средней и крайней паръ рулей равняется 12.5—19 mm.

1) Ibis, 1899, p. 430.

2) Монголія и стр. Тангутовъ, II, Птицы, p. 27.

3) DAVID & OUSTALET, Ois. Chine, p. 130.