

(0.5—0.75"), тогда какъ у *Ch. caschmiriensis* оно никогда не превосходитъ 6.5 mm. (0.25"). Менѣе надежные признаки старыхъ птицъ представляютъ: дымчатый оттѣнокъ бѣлыхъ частей низа тѣла, болѣе темныя подмышечныя и величина птицы. Длина крыла *Ch. caschmiriensis* не превосходитъ 105 mm. (4.14"), тогда какъ у *Ch. urbica* она въ громадномъ большинствѣ случаевъ бываетъ болѣе 105 mm. Изъ 41 взрослой *Ch. urbica*, со всего пространства, занятаго этимъ видомъ, я нашелъ лишь одинъ экземпляръ (♂ adlt., 13. VII. 1896, с. Чагартатау, вост. Персія, Н. А. Зарудный), у котораго она опустилась до 100.5 mm.; разстояніе между среднимъ и крайнимъ рулями равняется у него 17.5 mm. Безъ сомнѣнія такой же ненормально мелкій экземпляръ вѣроятно молодой *Ch. urbica*, а не *Ch. caschmiriensis* представляетъ птица, добытая 13. X. 1885 г. у Флоренціи¹⁾. Молодыхъ птицъ, хвостъ которыхъ окончательно еще не сформировался, отличать невозможно.

Еще ближе къ *Ch. caschmiriensis* свойственная южному Сахалину, гдѣ ее добылъ 8. VII. 1881 въ Александровкѣ А. М. Никольскій, и Японскому архипелагу *Ch. dasypus* Вонар. Глубина вилки хвоста не превосходитъ у нея 9 mm. (0.35"), длина крыла колеблется отъ 104 до 109 mm., низъ тѣла съ дымчатымъ оттѣнкомъ, главный же дифференціальный признакъ заключается въ узкихъ черноватыхъ полоскахъ, сопровождающихъ вѣтви нижней челюсти и сходящихся въ углу подбородка. У *Ch. caschmiriensis* перья, прилежащія къ вѣтвямъ нижней челюсти, бѣлыя, но уголь подбородка часто бываетъ темнымъ.

Матеріалы по роду *Chelidon* въ нашемъ музеѣ, какъ и во многихъ другихъ, довольно бѣдны, особенно же изъ Сибири и центральной Азіи. Поэтому я рекомендую будущимъ экспедиціямъ не пренебрегать сборами птицъ этого рода, такъ какъ точное распространеніе видовъ можетъ быть установлено лишь при наличности матеріаловъ изъ большого числа мѣстностей. Для лучшей ориентировки при собираніи привожу синоптическую таблицку для распознаванія взрослыхъ птицъ рода *Chelidon*.

- 1 (8) Нижнія кроющія хвоста бѣлыя или грязно-бѣлыя.
- 2 (7) Самыя заднія и длинныя изъ верхнихъ кроющихъ хвоста одноцвѣтны съ хвостомъ, бурья или черныя съ синимъ отливомъ, остальные же бѣлыя, какъ и надхвостье.
- 3 (4) Вилка хвоста глубокая: разстояніе между концами средняго и крайняго рулей равно 12.5—19 mm. (0.5—0.75"). Длина крыла большею частью больше 105 mm. (4.14"), очень рѣдко ниспадаетъ до 100.5 mm. Низъ тѣла чисто бѣлый; подмышечныя свѣтлѣе. — Европа, с. Африка и з. Азія до Енисея, Саяновъ, водораздѣла между верховьями Енисея и Лены въ сѣверной Монголіи, центрального Тянь-шаня, Кашгаріи, сѣв.-зап. Гималаевъ и Индостана. *Ch. urbica*.

1) GIGLIOLI, Avif. Italica, № 187 (1886); ARRIGONI DEGLI ODDI, Man. Orn. Ital., p. 146 (1904).