

- 4 (3) Вилка хвоста очень слабая: расстояние между концами среднего и крайнего рулей не больше 9 mm. (0.35"). Длина крыла не больше 105 mm. (4.14"). Низъ тѣла съ дымчатымъ оттѣнкомъ; подмышечныя темнѣе.
- 5 (6) Перышки, прилегающія къ вѣтвямъ нижней челюсти, бѣлыя. Длина крыла 98.5—105 mm. — Отъ Ладака, Гильгита и Кашмира по Гималаямъ и восточной окраинѣ Тибета къ сѣверу до Нань-шаня и Ала-шаня, а къ югу по Китаю до сѣв.-зап. угла пров. Фу-цзянь. **Ch. caschmiriensis.**
- 6 (5) Къ вѣтвямъ нижней челюсти прилегаютъ полоски изъ темныхъ перышекъ, сходящіяся въ углу подбородка. Длина крыла 104—109 mm. — Южный Сахалинъ и Японскій архипелагъ. **Ch. dasypus.**
- 7 (2) Самыя длинныя изъ верхнихъ кроющихъ хвоста бѣлыя сплошь или въ большей части. — В. Азія къ востоку отъ нижняго и средняго теченія Енисея, Саяновъ и водораздѣла между верховьями Енисея и Лены въ сѣверной Монголіи; къ югу до Мупина и центральныхъ провинцій Китая; въ прибрежномъ Китаѣ изрѣдка на пролетѣ, въ Бурмѣ рѣдко зимою. **Ch. lagopoda.**
- 8 (1) Нижнія кроющія хвоста черныя. — Гималаи отъ Непала до Сиккима, Ассама и Манипура. **Ch. nepalensis.**

169. *Biblis rupestris* (Scop.).

12.020'. 2 ♂ adlt., 1/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. р. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

Въ дневникѣ П. К. Козлова есть указаніе, что въ передній путь экспедиціи ласточка эта встрѣчалась время отъ времени по р. И-чю, одному изъ правыхъ притоковъ самаго верхняго теченія Голубой рѣки. На возвратномъ пути прилетѣ ея былъ впервые замѣченъ 16. III. 1901 на берегу Ды-чю (верхняго теченія Голубой рѣки), но это была лишь одна пара. У селенія Бана-джунъ въ первой трети апрѣля ласточка эта была уже довольно обыкновенна.

Область распространенія этого вида охватываетъ всѣ горныя страны отъ сѣверо-западной Африки и Пиренейскаго полуострова до западнаго Китая и юго-западной Монголіи; обособленныя колоніи существуютъ кромѣ того въ Абessinіи и въ западныхъ Гатахъ на Индостанѣ.

170. *Lillia daurica* (Linn.).

с. 13.000'. 2 ♀ adlt., 1/2. VII. 1900, р. Хи-чю, притокъ Ды-чю т. е. верхн. теченія Голубой рѣки.

с. 15.000'. ♂ adlt., 28. VIII. 1900, р. Ёнырь-чю, сист. Дза-чю, прав. прит. Дза-чю (Меконга).

Въ передній путь экспедиціи была «впервые встрѣчена на лѣвомъ притокѣ Голубой рѣки — Хи-чю на высотѣ ок. 13.000', а футовъ на 500 ниже водилась въ значительномъ количествѣ».

Тангуты называютъ этотъ видъ «калякэ».

Всѣ экземпляры вполне типичныя *L. daurica*.