

Всѣ 11 экземпляровъ, привезенныхъ экспедиціей П. К. Козлова, отличаются отъ птицъ, добытыхъ М. М. Березовскимъ близъ Лунь-н'гань-фу въ сѣверо-западной Сы-чуани, блѣдностью окраски и относительно слабымъ развитіемъ чернаго цвѣта на темени, затылкѣ и зашейкѣ. Спина у нихъ довольно свѣтлаго травяно-зеленаго цвѣта безъ всякаго оливковаго оттѣнка (приблизительно RIDGWAY, Nom. Col., X, 10); сѣрвато-зеленый цвѣтъ низа тѣла блѣднѣе; верхняя поверхность крыла съ относительно незначительною примѣсью оливковаго оттѣнка; сплошное черное пятно на зашейкѣ сравнительно узкое; перья затылка и темени сѣрыя съ черными наствольями, причемъ сѣрый цвѣтъ преобладаетъ надъ чернымъ, который на лбу у самки почти исчезаетъ. У птицъ изъ Сы-чуани спина оливково-зеленая, низъ тѣла темнѣе и съ оливковымъ оттѣнкомъ; верхняя поверхность крыла зеленовато-рыжая; сплошное черное пятно на зашейкѣ много шире, а преобладающій цвѣтъ затылка и темени черный, но не сѣрый. Птица, добытая д-ромъ Пясецкимъ на рѣкѣ Хань, притокѣ Голубой рѣки въ провинціи Ху-бэй (Ноо-ре) не отличима отъ сычуаньскихъ, но экземпляръ, собранный И. С. Поляковымъ на рѣкѣ Минь, выше Фу-чжоу, окрашенъ нѣсколько интенсивнѣе и относится къ болѣе темной формѣ, распространенной по южному Китаю. Такимъ образомъ птицы изъ Кама представляютъ крайнюю, самую блѣдную форму, а птицы изъ бассейна средняго и нижняго теченія Голубой рѣки являются промежуточными между ними и наиболѣе интенсивно окрашенной южной формой. Последняя получила названіе *Gecinus tancolo* GOULD 1862 и была установлена по экземпляру съ острова Формозы. Промежуточная форма извѣстна подъ именемъ *Gecinus guerini* (MALHERBE) 1849, но terra typica ея установить теперь невозможно; авторъ ея не указываетъ точно мѣстонахожденіе типа, онъ говоритъ только, что десятокъ экземпляровъ въ музеяхъ Парижа и Штутгарта, заставившій его установить этотъ видъ, происходитъ изъ Китая; мы можемъ только, предполагать, что она описана по птицамъ, добытымъ въ восточной части средняго Китая. Блѣдная тибетская форма нуждается въ названіи и я предлагаю назвать ее *Gecinus guerini kogo*, пользуясь съ этой цѣлью мѣстнымъ тибетскимъ названіемъ, какъ сдѣлалъ это GOULD для южной темной формы. При опредѣленіи этихъ трехъ формъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что отличить ихъ можно лишь при непосредственномъ сравненіи экземпляровъ. Рисунокъ *G. tancolo* у GOULD'a, B. Asia, VI, tab. 35, прекрасно представляетъ темную южную форму, но изображеніе *G. guerini* у MALHERBE'a, Mon. Pictidae, II, tab. 80, fig. 4 и 5, уже не точно: зеленый цвѣтъ спины слишкомъ блѣденъ не только для типичнаго *G. guerini guerini*, но даже и для *G. guerini kogo*. Оттѣнки зеленаго цвѣта спины могутъ быть намѣчены при-