

близительно при помощи скалы RIDGWAY'я въ Nom. Colors, tab. X, именно у *G. kogo* онъ чуть темнѣе № 10 (bice green), у *G. guerini* тономъ темнѣе № 21 (oil green), а у *G. tancolo* замѣтно темнѣе № 18 (olive green).

Діагнозъ новой формы слѣдующій:

Gecinus G. guerini simillimus, sed ubique pallidior, maculâ spissâ nigrâ auchenali comparative angusta, plumis occipitis verticisque pro majore parte cinereis, solummodo striis suprarrhachidalibus nigris tenuibus ornatis, nigredine frontali in feminâ fere evanescente; dorso laete-viridi (RIDGWAY, Nom. Col., X, 10, bice green), non oleagineo-viridi (RIDGWAY, X, 21) ut in *G. guerini guerini*, nec olivaceo-viridi (RIDGWAY, X, 18) ut in *G. guerini tancolo*; colore cinerascenti-viridi pectoris abdominisque quam in *G. guerini guerini* pallidior; superficie superiore alae minus quam in *G. guerini guerini* olivaceo tinctâ.

Область распространенія трехъ формъ можно очертить лишь въ общихъ чертахъ, такъ какъ блѣдная форма пока вовсе не отличалась, а остальные двѣ перестали отличаться орнитологами съ тѣхъ поръ, какъ ихъ соединилъ HARGITT¹⁾ въ 1890 году.

G. guerini tancolo помимо Формозы, откуда онъ описанъ впервые, и о-ва Хайнана, откуда его описалъ, не давъ ровно никакихъ отличій, OGILVIE-GRANT²⁾ подъ именемъ *G. hainanus*, распространень по DAVID'у³⁾ вѣроятно по всему южному Китаю отъ провинціи Фу-цзянь (Fo-kien) до Сы-чуани; въ послѣдней провинціи водится впрочемъ, какъ увидимъ ниже, и типичный *G. guerini guerini*. Изъ отдѣльныхъ мѣстонахожденій несомнѣнно къ этой формѣ относятся: Canton (HARGITT) и Swatow hills (LA TOUCHE⁴⁾ въ пров. Гуанъ-дунъ (Quang-tung); Foo-chow (экз. Полякова, LA TOUCHE⁴⁾ въ прибрежной части пров. Фу-цзянь (Fo-kien), центральная ея часть (LA TOUCHE et RICKETT⁵⁾) и Kuatun (LA TOUCHE⁶⁾ въ сѣверо-западной ея части; Chien-yang на рѣкѣ Yuan въ юго-восточномъ Ху-нанѣ (Hoo-nan; OGILVIE-GRANT⁷⁾). Не рѣшаюсь предположить, къ ней ли относится указаніе HARGITT'а⁸⁾ для Cha-foo-shan district въ пров. Чжэ-цзянь (Che-kiang) и для о-ва Poo-too.

G. guerini guerini свойственъ бассейну нижняго и средняго теченія Голубой рѣки. По всей вѣроятности къ нему относятся мѣстонахожденія:

1) Cat. B. Brit. Mus., XVIII, pp. 55—56; Ibis, 1888, pp. 11—15.

2) Ibis, 1899, p. 584.

3) DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 53.

4) Ibis, 1892, p. 478.

5) Ibis, 1905, p. 48.

6) Ibis, 1900, p. 42.

7) Ibis, 1900, p. 596.

8) Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 56.