

Ning-ro (HARGITT¹) въ сѣверной части пров. Чжэ-цзянь (Che-kiang) и о-ва Чжу-санъ (Chu-san; HARGITT¹), расположенные противъ нея же; далѣе несомнѣнно къ нему: Shanghai (SWINHOE²), HARGITT¹), общія указанія для долины нижняго теченія Голубой рѣки (DAVID³), СЕЕВОНМ⁴), STYAN⁵), Nankin (HARGITT¹) въ пров. Цзянь-су (Kiang-su), Woo-chung (SLATER⁶) и р. Хань (экз. Пясецкаго) въ центральномъ Ху-бэй (Hoo-pe), Patung (STYAN⁷) въ той же провинціи близъ границы Сы-чуани, южная часть пров. Шень-си (DAVID³), южный уголъ провинціи Гань-су (Березовскій⁸), ущелье Хо-цзи-гоу къ сѣверу отъ Лунь-н'гань-фу въ сѣв.-зап. Сы-чуани, (экз. Березовскаго), наконецъ Да-цзянь-лу (Ta-chien-lu; СЕЕВОНМ⁹) и OUSTALET¹⁰) и Тап-го-ло (OUSTALET¹⁰) въ центральной Сы-чуани. Сомнительнымъ остается слѣдующее указаніе НАРТЛАУВ'а¹¹): «Beide Geschlechter von Tientsin. Auch von Tlao-chu-hien und von Lushan».

G. guerini kogo свойственъ повидимому лишь юго-восточной части Тибета. Кромѣ мѣстностей, гдѣ его добыла экспедиція П. К. Козлова, несомнѣнно къ нему же относятся мѣстонахожденія, приводимыя OUSTALET¹⁰), именно Sigolo къ востоку отъ Батана, въ бассейнѣ верхняго теченія Голубой рѣки, и Landjounг въ бассейнѣ истоковъ Салуэна къ востоку отъ озера Тенгри-норъ въ центральной части южнаго Тибета.

G. guerini, особенно *G. guerini tancolo*, чрезвычайно близокъ къ *G. occipitalis* (VIG.) 1830 и я сомнѣваюсь въ томъ, чтобы онъ заслуживалъ видовой самостоятельности¹²). Я присоединяюсь къ HARGITT'у въ томъ, что существуютъ лишь два признака, отличающихъ *G. guerini* отъ *G. occipitalis*, — окраска нижней челюсти и окраска хвоста. У *G. guerini* основаніе нижней челюсти желтое или по крайней мѣрѣ съ желтизной, а у *G. occipitalis* вся нижняя челюсть темная; у нѣкоторыхъ экземпляровъ *G. guerini* желтизна эта однако едва замѣтна, а у нѣкоторыхъ особей *G. occipitalis* есть намекъ на нее. Нѣсколько болѣе стойка окраска хвоста, но диффе-

1) Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 56.

2) Ibis, 1863, p. 96; Proc. Zool. Soc. London, 1863, pp. 268, 333; 1871, p. 392.

3) DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 53.

4) Ibis, 1884, p. 266.

5) Ibis, 1891, p. 325.

6) Ibis, 1882, p. 435.

7) Ibis, 1899, p. 292.

8) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 47.

9) Ibis, 1891, p. 378.

10) Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) V, 1893, p. 133.

11) Abh. naturwiss. Ver. Bremen, XII, 1893, pp. 298, 317.

12) Если въ концѣ концовъ *G. guerini* окажется подвидомъ *G. occipitalis*, то номенклатура формъ должна быть такая: *G. occipitalis occipitalis* (VIG.) 1830; *G. occipitalis tancolo* GOULD 1862; *G. occipitalis guerini* (MALH.) 1849 и *G. occipitalis kogo* BIANCHI 1906.