

ренціальний признакъ этотъ формулированъ у HARGITT'a не точно. Онъ говоритъ, что у *G. guerini* всѣ рули въ сѣроватыхъ перевязяхъ, а у *G. occipitalis* лишь одна средняя пара. Окраска хвоста прежде всего признакъ возрастной: и самъ HARGITT¹⁾, и BLANFORD²⁾ категорически заявляютъ, что у молодого *G. occipitalis* всѣ рули въ перевязяхъ. Съ другой стороны, у всѣхъ трехъ формъ *G. guerini* окраска четырехъ среднихъ паръ рулей варьируетъ очевидно тоже въ зависимости отъ возраста: у многихъ они сплошь темны, у другихъ съ болѣе или менѣе явственными слѣдами свѣтлыхъ перевязей, у третьихъ въ рѣзкихъ сѣроватыхъ перевязяхъ. Зато у всѣхъ же трехъ формъ крайняя пара рулей либо на всемъ своемъ протяженіи въ явственныхъ перевязяхъ, либо сѣроватая въ своей конечной части, особенно на нижней поверхности перьевъ, тогда какъ у взрослыхъ *G. occipitalis* рули этой пары одноцвѣтны и темны до конца. Слѣдовательно, наиболѣе надежный дифференціальний признакъ взрослыхъ птицъ заключается въ характерѣ окраски не всего хвоста, а только крайней пары рулей. Общій характеръ окраски тѣла *G. occipitalis* такой же, какъ у *G. guerini tancolo*.

Всѣ эти зеленые дятлы относятся къ группѣ *G. canus*, который отличается отъ нихъ отсутствіемъ чернаго цвѣта на зашейкѣ, и подобно японскому *G. awokera* находятся въ болѣе близкихъ родственныхъ отношеніяхъ къ группѣ *G. viridis*, чѣмъ группа *G. vittatus*, къ которой принадлежатъ кромѣ того *G. squamatus*, *G. gorii*, *G. viridanus* и *G. striolatus*. Взаимныя отношенія зеленыхъ дятловъ выражены HARGITT'омъ въ синоптическомъ обзорѣ въ Ibis, 1888, pp. 3—6 слѣдовательно болѣе правильно, чѣмъ въ Cat. B. Brit. Mus., XVIII, pp. 33—36. Однако и эта группировка нуждается въ небольшой поправкѣ. Дѣло въ томъ, что характеръ отмѣтинъ на перьяхъ нижней стороны тѣла формулированъ HARGITT'омъ не достаточно точно. У формъ группы *G. vittatus* темныя отмѣтины эти всегда продольны и представляютъ конечный или предконечный ободокъ, въ придачу къ которому у нѣкоторыхъ формъ имѣется еще темная наствольная полоса, а у *G. awokera* и формъ группы *G. canus* и *G. viridis* темныя отмѣтины явственно поперечны. Кромѣ того характеристика группы *G. occipitalis* и *G. canus* — «under surface of the body perfectly uniform» — не вѣрна даже для взрослыхъ птицъ, такъ какъ у взрослыхъ особей группы *G. viridis* на нижней сторонѣ тѣла тоже почти нѣтъ темныхъ отмѣтинъ, у молодыхъ же онѣ болѣе или менѣе развиты въ обѣихъ группахъ. Въ виду всего сказаннаго я предлагаю слѣдующую характеристику группъ зеленыхъ дятловъ безъ желтаго хохла и краснаго цвѣта на крылѣ.

1) Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 57; Ibis, 1888, p. 9.

2) Faun. Brit. Ind., Birds, III, p. 23.