

175. *Picoides funebris* VERR.

- 13.040'. ♂ adlt., 2 ♀, ad. & jun., II/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю или верхн. Меконга.
 13.040'. 2 ♀ jun., 1/2 X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю.
 11.430'. ♀ adlt., 27—30. X. 1900, р. Ному-чю, прит. Дза-чю (Меконга).
 11.960'. 2 ♂ adlt., XII. 1900 и I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Дза-чю (Меконга).

У трехъ самокъ (помѣченныхъ jun.) перья не только лба, но и темени въ бѣлыхъ пятнышкахъ на вершинѣ, тогда какъ у остальныхъ двухъ бѣлыя пятнышки только на лбу; вѣроятно послѣднія самки старше другихъ. Низъ тѣла у всѣхъ экземпляровъ чернаго, а не бураго цвѣта.

«Впервые встрѣченъ на Баръ-чю въ бассейнѣ Меконга; онъ держался почти въ верхней зонѣ еловаго лѣса, большою частью на сухихъ и усыхающихъ деревьяхъ, на абсолютной высотѣ приблизительно 13.000 футовъ».

За исключеніемъ американскаго *P. arcticus* разсматриваемая форма является наиболѣе обособленной и вполне заслуживаетъ видовой квалификаціи. Она легко отличается отъ всѣхъ остальныхъ рѣзкимъ преобладаніемъ на нижней сторонѣ тѣла чернаго цвѣта надъ бѣлымъ; помимо преобладанія чернаго въ окраскѣ индивидуальныхъ перьевъ для нея весьма характерно то, что бѣлый или бѣловатый цвѣтъ распространяется у нея болѣе или менѣе сплошнымъ полемъ не далѣе какъ до зоба, тогда какъ у всѣхъ остальныхъ формъ рода *Picoides* онъ доходитъ по нижней груди до брюха включительно.

Видъ этотъ свойственъ исключительно юго-восточному Тибету и находки его всѣ наперечетъ. Открытъ онъ былъ А. DAVID'омъ въ горахъ Уао-tchu къ западу отъ Мупина въ центральной Сы-чуани. Затѣмъ СЕЕВОМ¹⁾ упоминаетъ объ экземплярѣ, добытомъ А. Е. РРАТТ'омъ на высотѣ 13.500 ф. нѣсколько къ западу отъ Да-дзянь-лу. Птица, добытая принцемъ Г. Орлеанскимъ и Бонвало 31. III. 1890 въ Тшеупеу въ бассейнѣ самаго верхняго теченія Салуэна къ востоку отъ озера Тенгри-норъ, разомъ расширила область распространенія вида на западъ, а сборъ П. К. Козлова нѣсколько на сѣверъ. Наконецъ М. М. Березовскій, собравшій самку 26. V. 1893 г. въ ущельи Хо-цзи-гоу къ сѣверу отъ Лунь-н'гань-фу, значительно расширилъ область къ сѣверо-востоку.

176. *Picus martius* LINN.

- 3480'. ♂, ♀ juv. 1-а в., VI. 1899, станица Алтайская.
 7100'. ♂ adlt., II. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.
 7100'. ♂ adlt., III. 1900, кум. Чортэнтанъ, Нань-шань.
 12.020'. (♂) ♀ adlt., 1. IX. 1900, р. Дза-чю, прит. Дза-чю (Меконга).

1) Ibis, 1891, p. 376.