

Молодые птицы еще въ буровато-черномъ нарядѣ и съ небольшимъ количествомъ краснаго у самца по всей головѣ, а у самки лишь на затылкѣ. Полъ птицы съ Дзэ-чю былъ опредѣленъ невѣрно: это самка.

«У станицы Алтайской былъ не рѣдокъ».

«Въ Нань-шанѣ у кумирни Чортэнтанъ держался, какъ и повсюду, въ хвойныхъ лѣсахъ» и приступилъ уже къ размноженію, такъ какъ П. К. Козловъ отмѣчаетъ, что птицы «были подвижны и вели себя очень шумно, постоянно пролетая съ звонкимъ крикомъ или громко стуча по деревьямъ».

«Послѣ Нань-шаня *P. martius* былъ встрѣченъ впервые въ еловыхъ лѣсахъ горы Болонго на рѣкѣ Дзэ-чю, притокѣ Меконга, гдѣ былъ очень обыкновененъ».

Птица изъ Кама ничѣмъ не отличается отъ европейскихъ.

Сем. *Jynxidae*.

177. *Jynx torquilla* LINN.

3480'. 2 ♂, ♀ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.

12.020'. 2 ♂, ♀ adlt., 1/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. Голубой рѣки.

«У станицы Алтайской гнѣздилась въ густыхъ заросляхъ рѣчки Сарымъ-сакты».

«Въ окрестностяхъ селенія Бана-джунъ», въ долинѣ рѣчки Сэръ-чю, впадающей въ р. Дзэ-чю, притокѣ Голубой рѣки, «держалась въ кустарникахъ и гнѣздовала уже 9 апрѣля».

Сем. *Cypselidae*.

178. *Cypselus apus pekinensis* SWINH.

10.910'. 2 ♀ adlt., 3/3. VI. 1901, ущелье Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-будда, басс. Желтой рѣки.

Объ этой формѣ въ дневникѣ П. К. Козлова нѣтъ никакихъ свѣдѣній.

Этотъ подвижъ едва отличается отъ *C. apus* нѣскольکو большей блѣдностью окраски верха, главнымъ образомъ хвоста и особенно головы.

179. *Cypselus pacificus* (LATH.).

12.860'. ♂ adlt., 27—30. VII. 1900, р. И-чю, притокѣ Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.