

IX. 1890, оз. Гашунъ-норъ<sup>1)</sup> или Узунъ-шоръ у западной оконечности хребта Чамень-тагъ; всѣ эти птицы собраны экспедиціей М. В. Пѣвцова. Вѣроятно къ этой же формѣ принадлежатъ экземпляры, добытые SCULLY<sup>2)</sup> въ западной Кашгаріи — ♂ (кр. 19.0" = 482 mm., вѣроятно самка!) и ♀ (кр. 18.5" = 465 mm., вѣроятно самець!), 3. IV. 1875 изъ Яркенда и ♂ (кр. 18.8" = 478 mm.), 18. IV. 1875 изъ Каргалыка. Во время второго своего путешествія Н. М. Пржевальскій добылъ въ VI. 1877 г. на Юлдусѣ, въ центральномъ Тянь-шанѣ, крупную блѣсоватую самку (крыло 490 mm.), которую я считаю тоже типичнымъ *B. bubo sibiricus*. Съ другой стороны филины, добытые во время четвертаго путешествія Н. М. Пржевальскаго въ Цайдамѣ — ♀ (кр. 450 mm.), XI, 1884, уроч. Гасъ; два ♂ (кр. 450 и 440 mm.), южн. Цайдамъ; ♂ (кр. 450 mm.), IV. 1884, хреб. Южно-Кукунорскій — и экспедиціей братьевъ Грумъ-Гржимайло въ садахъ оазиса Хами у подошвы хребта Карлыкъ-тагъ — ♂ (кр. 445 mm.), 21. XII. 1899 и ♀ (кр. 465 mm.), 11. I. 1890 — хотя и блѣдны, но значительно рыжѣе птицъ П. К. Козлова и М. В. Пѣвцова. Можно ли считать какъ этихъ птицъ, такъ и нѣкоторыхъ другихъ, собранныхъ въ центральномъ Тянь-шанѣ экспедиціей В. И. Роборовскаго (♂, кр. 450 mm., VII. 1893, дол. р. Текеса) и С. Н. Алфераки (♂, кр. 440 mm., 16. III. 1879, Хоргосъ) и въ Тарбагатаѣ Коломейцевымъ (♀, кр. 450 mm., 25. VIII. 1878, Кендерлыкъ) за *B. bubo turcomanus*, я еще не знаю, такъ какъ всѣ признаки, считавшіеся до сихъ поръ дифференціальными, положительно не выдерживаютъ критики и въ основу діагностики формъ conspecies'a *B. bubo* должны быть положены новые — вѣроятно блѣдность и интенсивность окраски, а также оттѣнки рыжаго цвѣта. Число формъ, на которыя распадается *B. bubo* несомнѣнно больше, чѣмъ до сихъ поръ предполагалось. Частью вслѣдствіе этого область распространенія *B. bubo sibiricus* очерчивалась совершенно невѣрно. Такъ, М. А. Мензбиръ и TASCZANOWSKI доводятъ ее до Охотскаго моря, между тѣмъ экземпляры Оленина изъ Якутскаго округа, Миддендорфа изъ Удскаго Острога и Супруненко съ Сахалина доказываютъ, что крайнему востоку Сибири свойственна группа темныхъ формъ, болѣе близкая къ типичному западно-европейскому *B. bubo bubo*. Съ другой стороны экземпляры Радде съ озера Тарей-норъ (♂, кр. 440 mm., 6. X. 1856, и ♀, кр. 500 mm., 24. III. 1856) и со средняго теченія Онона (? ♂, кр. 490 mm., 15. XII. 1855), а также самецъ (кр. 460 mm.), добытый Н. М. Пржевальскимъ въ Южно-Уссурійскомъ краѣ на р. Сун-

1) Не смѣшивать съ Гашунъ-норомъ въ южномъ Цайдамѣ.

2) Str. Feath., IV, 1876, p. 129; cf. SCULLY, Ibis, 1881, p. 425 = Str. Feath., X, p. 98.