

гачь, относятся къ блѣдной формѣ, болѣе близкой, если не тождественной, съ *B. bubo sibiricus*. Подобная же переходная форма свойственна повидимому и западной части Киргизскихъ степей въ области рѣкъ Урала и Эмбы. Филина изъ области верхняго Поволжья Житковъ и Бутурлинъ¹⁾ предлагаютъ выдѣлить подъ названіемъ *B. bubo ruthenus*.

Отъ филина, добытаго П. К. Козловымъ въ южномъ Алтаѣ рѣзко отличаются два слѣдующихъ экземпляра изъ бассейна верхняго теченія Голубой рѣки.

182. *Bubo bubo tibetanus* BIANCHI,

Bull. Brit. Orn. Club, XVI, 1906, p. 69.

с. 14.000'. ♂, ♀ adlt., VII. 1900, верховье рѣч. Хи-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.

Bubo B. buboni setschuanus REICHW. 1903 similis, sed multo major, long. alae ♂ 460—470, ♀ 480—500 mm. contra ♂ 401—425 mm. in *B. bubone setschuanus*.

П. К. Козловъ отмѣчаетъ въ дневникѣ, что самка «добыта 10 іюля на высотѣ 14.000' въ ущельи верхняго пояса горъ», но не говоритъ о самцѣ, который собранъ очевидно вскорѣ послѣ нея. Вѣроятно къ этой же формѣ, какъ видно будетъ изъ обзора ея распространенія, относятся и слѣдующія замѣтки П. К. Козлова: «Попадался на глаза въ горахъ Бурханъ-Будда, чаще въ Амнэнъ-коръ и по утесистымъ берегамъ озера Русскаго» или Оринъ-норъ въ бассейнѣ верхней Хуанъ-хэ.

Эти птицы (крыло ♂ 460, ♀ 480 mm.), добытыя на южной сторонѣ водораздѣла между системами Желтой и Голубой рѣки, принадлежатъ къ группѣ темныхъ формъ, у которыхъ рыжій цвѣтъ въ опереніи варьируетъ отъ желто-охристаго до блѣдно-коричневаго, но не бываетъ ни буланымъ, ни палевымъ, а бѣлый цвѣтъ развитъ очень слабо. Въ общемъ обѣ эти птицы очень напоминаютъ съ одной стороны типичную форму *B. bubo bubo* изъ западной Россіи, а съ другой восточно-сибирскую; широкія черныя продольныя настволья зоба переходятъ у нихъ въ болѣе узкія на груди и въ очень узкія на брюхѣ.

Во всемъ этомъ онѣ сходны съ парой филиновъ (♂, кр. 470; ♀, кр. 500 mm.), добытыхъ Н. М. Пржевальскимъ во время третьяго путешествія въ декабрѣ 1880 года, на высотѣ 15.600', на южной сторонѣ хребта Танъ-ла въ центральномъ Тибетѣ, и съ филинами, собранными экспедиціей

1) Матер. орнитоф. Симбирск. губ., р. 272 въ Зап. общ. геогр. И. Р. Географ. Общ., XII, 1906.