

Кіао-чао (Цзэ-чжоу) въ прибрежной полосѣ Китая REICHENOW¹⁾ описалъ еще одну очень темную форму, у которой «zieht das Gelbbraun im Gefieder nicht ins Ockergelbe, sondern ins Zimtbraune»; авторъ считаетъ ее повидимому за видъ и называетъ *B. kiautschensis*. По поводу этого замѣчу, что два выше упомянутыхъ филина съ Сахалина отличаются той же блѣдно-коричневой окраской и вообще являются самыми темными птицами изъ сотни шкурокъ, которыми *B. bubo* представленъ въ нашемъ музеѣ. Длина крыла экземпляра REICHENOW'а равна 540 мм., сахалинскихъ 450 и 465 мм. Вопросъ о самостоятельности всѣхъ перечисленныхъ тутъ формъ темной группы я оставляю открытымъ до болѣе тщательнаго и подробнаго изученія всего conspecies'а, которое вѣроятно дастъ намъ возможность найти комплектъ признаковъ, отличающихъ темныхъ восточно-азиатскихъ филиновъ отъ европейскаго. Въ заключеніе напомнимъ, что въ горномъ узлѣ, связывающемъ Гималаи съ Гинду-кушемъ и Куэнь-лунемъ, живутъ двѣ блѣдныя формы, изъ которыхъ одну BIDDULPH и MARSHALL²⁾ отождествляютъ, врядъ ли правильно, съ *B. bubo turcomanus*, а другую НУМЕ³⁾, MARSHALL²⁾ и SCULLY⁴⁾ считаютъ стоящей ближе къ *B. bubo bubo*. Этой послѣдней НУМЕ далъ названіе *B. hemachalanus*, а SCULLY полагаетъ, что она заслуживаетъ по меньшей мѣрѣ подвидовой квалификаціи. Къ ней относятся: типъ НУМЕ'а, полученный изъ Кулу въ сѣверо-западныхъ Гималаяхъ; птица, добытая W. E. HAY'емъ у озера Pangong въ Ладакѣ и наконецъ два самца (кр. 17.1" = 433 и 17.2" = 435 мм.), собранныхъ SCULLY въ Гильгитѣ. За *B. turcomanus* считаютъ птицу, вѣроятно самку (крыло 19.1" = 485 мм.), собранную BIDDULPH'омъ 4. I. въ Гильгитѣ. Всѣ эти птицы должны находиться теперь въ Британскомъ музеѣ.

183. *Athene bactriana* ВЛУТН.

- 8670'. ♂ adlt., 26. I. 1900, дол. р. Чагрынъ-голь, Нань-шань.
 9350'. ♀ adlt., 9—11. III. 1900, кум. Чойбзэнъ, Нань-шань.
 с. 14.000'. pull., II/з. VII. 1900, верх. рѣч. Хи-чю, впад. въ Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
 с. 13.000'. ♂ adlt., I/з. VIII. 1900, дол. рѣч. Дза-чю, впад. въ Цзанъ-да, прит. Ды-чю (Голубая р.).
 с. 12.000'. ♀ adlt., I/з. IX. 1900, р. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
 с. 13.000'. ♂ adlt., к. II. 1901, верхов. р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.
 с. 9000'. ♂ adlt., I/з. VIII. 1901, вост. Цайдамъ.
 с. 4000'. ♂ adlt., I/з. X. 1901, средняя Гоби.
 с. 4000'. ♂ adlt., III/з. X. 1901, сѣверная Монголія.

1) Orn. Monatsber., XI, 1903, p. 85.

2) Ibis, 1881, pp. 45—46 = Str. Feath., IX, 1890, pp. 410—411.

3) Str. Feath., I, 1873, p. 315.

4) Ibis, 1881, p. 425 = Str. Feath., X, 1891, p. 98.