

Экземпляръ, добытый въ первой трети августа въ восточномъ Цайдамѣ, въ болѣе обношенномъ опереніи, чѣмъ птица, добытая въ то же время въ бассейнѣ Голубой рѣки (дол. Дза-чю); линять ни тотъ, ни этотъ еще не начали. Самка, убитая въ первой трети сентября, уже въ свѣжемъ нарядѣ, какъ и октябрьскія птицы. Птенецъ, добытый, судя по маршруту, во второй трети іюля мѣсяца, имѣетъ еще пуховой нарядъ на головѣ и подхвостьѣ; рули и махи у него еще не отрасли, но ростомъ онъ только немного меньше взрослыхъ птицъ.

«Этотъ сычъ наблюдался изрѣдка на всемъ протяженіи Гобійскаго Алтая; въ равнинной части Гоби (начиная съ кол. Цахиринъ-худукъ до культурной полосы у подножія Нань-шаня) его нѣтъ, но онъ сталъ снова попадаться со вступленіемъ въ оазисы (Сого-хото, Лянъ-чжоу) сѣверной окраины Нань-шаня. Далѣе, одинокая птица была добыта на развалинахъ глиняныхъ построекъ у кумирни Чойбзэнъ. Въ сѣверномъ Тибетѣ сычъ обыкновененъ по обрывистымъ склонамъ ущелій. Молодой, уже начавшій немного перелинивать, былъ пойманъ туземцемъ при урочищѣ Донъ-ра въ верховьяхъ рѣчки Хи-чю», уже на южномъ склонѣ водораздѣла между системами Желтой и Голубой рѣкъ, слѣдовательно въ бассейнѣ этой послѣдней. На верхнемъ теченіи Меконга *Ath. bactriana* была добыта какъ на правыхъ, такъ и на лѣвыхъ притокахъ этой рѣки. Относительно области лѣвыхъ притоковъ П. К. Козловъ отмѣчаетъ: «Въ ущельи горъ по рѣчкѣ Чжа-чю», притока Гэ-чю, «сычъ встрѣчался нерѣдко и днемъ, и вечеромъ, ночью же всегда выдавалъ себя своимъ оригинальнымъ монотоннымъ крикомъ. Птицы держались или въ кустарникахъ, или по обрывамъ ущелій. Одна подстрѣленная птица заползла въ пещеру».

Тангуты Голубой рѣки называютъ этого сыча — «*огочонгъ*».

### Сем. *Alcedinidae*.

#### 184. *Alcedo ispida bengalensis* Gmel.

4000'. ♂ adlt., VII. 1899, р. Бухтарма, прит. Иртыша, Алтай.

Длина крыла равняется 71 mm., culmen 43 mm.; окраска яркая и блѣдная.

Относительно другихъ мѣстностей, посѣщенныхъ экспедиціей, въ дневникѣ нѣтъ никакихъ замѣтокъ объ этомъ видѣ.