

Сем. **Upipidae.**185. **Upupa epops** LINN.

3480'. ♂ adlt., VII. 1899, станица Алтайская.

«У станицы Алтайской былъ обыкновенной гнѣздящейся птицей». Изъ остальныхъ пройденныхъ экспедиціей мѣстностей нѣтъ указаній.

Отрядъ **Cuculiformes.**Сем. **Cuculidae.**186. **Cuculus canorus** LINN.

- с. 4000'. ♂ semiadlt., VII. 1899, р. Бухтарма, прит. Иртыша, Алтай.  
 с. 13.000'. ♂ juv. vest. interm., 7—8. VIII. 1900, рѣч. Дза-чю, впад. въ Цзанъ-да, притокъ Ды-чю (Голубая р.).  
 с. 12.630'. ♂? juv. vest. interm., 22. VIII. 1900, кум. Бэнчинъ-гомба, рѣч. Горъ-чю, впад. въ рѣч. Дза-чю, прит. Цзанъ-да, системы Ды-чю (Голубая рѣка).  
 с. 13.000'. ♀ semiadlt., 1/3. V. 1901, р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.  
 9890'. ♂ juv. vest. interm., 13—14. VIII. 1901, оз. Далай-дабасу у южн. подошвы хребта Южно-Кукунурскаго.

Первый экземпляръ добытъ въ «густыхъ заросляхъ рѣки Бухтармы». Въ бассейнѣ Голубой рѣки, точнѣе ея великаго притока Дза-чю, «кукушка впервые закуковала (въ 1901 г.) 2 мая и съ этихъ поръ кукованіе ея слышалось уже почти ежедневно».

Я не вхожу тутъ въ самостоятельное изслѣдованіе различныхъ формъ кукушекъ и пока придерживаюсь взглядовъ OATES'a<sup>1)</sup>, SHELLEY'я<sup>2)</sup> и BLANFORD'a<sup>3)</sup>; считаю однако необходимымъ мотивировать опредѣленіе каждаго изъ перечисленныхъ выше экземпляровъ.

Всѣ пять птицъ въ переходномъ, рыжемъ нарядѣ и за исключеніемъ послѣдняго экземпляра съ озера Далай-дабасу по крайней мѣрѣ со слѣдами бѣлаго затылочнаго пятна, котораго не бываетъ въ переходной формѣ *C. saturatus*. У экземпляра съ Бухтармы на затылкѣ осталось лишь одно бѣлое перо; весь верхъ тѣла, въ томъ числѣ и сѣроватыя уже надхвостье и верхнія кроющія хвоста, частью въ блѣдно-рыжихъ, частью въ бѣлыхъ перевязяхъ на перьяхъ, многія изъ которыхъ имѣютъ кромѣ того бѣлые кончики; низъ

1) Ibis, 1889, pp. 355—359.

2) Cat. B. Brit. Mus., XIX, pp. 240—265.

3) Faun. Brit. Ind., Birds, III, pp. 204—211.