

тѣла въ узкихъ, волнистыхъ, довольно неправильныхъ черныхъ перевязяхъ; длина крыла равняется 197 мм. т. е. нѣсколько короче минимальной длины крыла (203 мм.) взрослой *C. canorus*; узкія перевязи низа тѣла указываютъ однако на то, что это *C. canorus*. Два экземпляра, добытые въ бассейнѣ Голубой рѣки въ августѣ, почти одинаковы, оба имѣютъ бѣлое пятно на затылкѣ, перья всего верха въ темно-рыжихъ перевязяхъ, съ болѣе или менѣе сохранившимися бѣлыми кончиками, низъ тѣла въ широкихъ, довольно неправильно очерченныхъ черныхъ перевязяхъ; длина крыла у экз. изъ кум. Бэнчинъ-гомба равна 197, у экз. съ рѣчки Дза-чю — 198 мм.; темно-рыжій цвѣтъ и ширина перевязей на перьяхъ низа тѣла говорили бы въ пользу *C. saturatus*, но длина крыла у столь молодыхъ птицъ и хорошо развитое бѣлое пятно на затылкѣ заставляютъ меня отнести ихъ съ *C. canorus*, причемъ противорѣчащія этому опредѣленію признаки я объясняю молодостью птицъ. Тоже самое можно сказать о почти тождественной птицѣ съ озера Далай-дабасу, но она не представляетъ уже никакого сомнѣнія, такъ какъ имѣетъ крыло въ 208 мм. Экземпляръ, добытый въ бассейнѣ Голубой рѣки въ первой трети мая, сверху очень яркаго рыжаго цвѣта въ черныхъ перевязяхъ, но надхвостье и верхнія кроющія хвоста почти сплошь рыжія, такъ какъ на перьяхъ этихъ областей уцѣлѣли лишь спорадически черноватая пятнышки, представляющія остатки бывшихъ перевязей; низъ тѣла бѣлый въ узкихъ, волнистыхъ, неправильныхъ черныхъ перевязяхъ; бѣлаго пятна на затылкѣ нѣтъ; крыло въ 215 мм.; длина крыла, узкія перевязи на нижней сторонѣ тѣла и блѣдность рыжаго цвѣта говорятъ безусловно за то, что и эти птицы *C. canorus*.

Отрядъ Columbiformes.

Сем. Columbidae.

187. *Columba rupestris* PALL.

с. 6000'. ♀ adlt., 3—4. VIII. 1899, верхн. теч. р. Кобдо, Алтай.

«Встрѣчался вездѣ по горамъ, до сихъ поръ» (отъ станицы Алтайской) «нами пройденнымъ; тутъ по сосѣдству скалъ держалось стадо штукъ въ 30—40».

Отъ *C. rupestris*, основанному PALLAS'омъ¹⁾ на экземплярахъ изъ

1) Zoogr. Ross.-Asiat., I, p. 560, tab. XXV. — SALVADORI (Cat. B. Brit. Mus., XXI, p. 250) напрасно приписываетъ PALLAS'у еще другое названіе этого вида: на стр. 562 PALLAS не называетъ эту форму, а только приводитъ описаніе varietatis *rupicola* dauricae, т. е. живущей въ горахъ Дауріи.