

вальскій нашель его въ первое и четвертое свои путешествія въ альпійской зонѣ восточнаго Нань-шаня на высотѣ 10.—13.000'; братья Грумъ-Гржимайло тутъ же, на перевалѣ Лянжа-сянь въ окрестностяхъ г. Синина. Въ третье путешествіе Н. М. Пржевальскій собиралъ его въ хребтѣ Джунаръ или Ревенномъ и въ горахъ Джахаръ на верховьяхъ Желтой рѣки, гдѣ добыла его и экспедиція Роборовскаго въ ущельи Мзушургымчонъ хребта Амнэ-мачинъ. Въ бассейнѣ Голубой рѣки его впервые открылъ у Сунь-паня въ Сюэ-шанѣ провинціи Сы-чуань М. М. Березовскій въ 1894 г., а потомъ отсюда же получилъ и Стюан¹⁾. Въ центральной части той же провинціи Сы-чуань видъ этотъ былъ добытъ принцемъ Г. Орлеанскимъ и Бонвало²⁾ въ Самра между Батаномъ и Литаномъ. Наконецъ, изъ бассейна Меконга его доставилъ теперь П. К. Козловъ, почти соединившій такимъ образомъ гималайскую часть области распространения вида съ частью, протянувшейся по восточной окрестности Тибета. DAVID нигдѣ не встрѣчалъ этого вида во время своихъ путешествій по Китаю.

Сем. *Peristeridae*.

189. *Turtur ferrago* (EVERSM.).

3480'. ♂ adlt., VII. 1899, станица Алтайская.

«Держалась у станицы Алтайской въ открытой долинѣ по деревьямъ, одиноко стоявшимъ по теченію арыка».

Нижнія кроющія крыла очень темнаго сѣраго цвѣта, подхвостье же и концы рулей бѣлые.

190. *Streptopelia doucaca stoliczkae* (HUME).

4400'. ♀ adlt., 10—12. I. 1900, оазисъ Сого-хото, южный Ала-шань.

«Спорадически наблюдалась при первомъ вступленіи въ культурную полосу, протянувшуюся вдоль сѣверной подошвы Нань-шаня».

Наружное опахало крайней пары рулей черное на большей части своей длины, причемъ черный цвѣтъ идетъ на немъ много дальше къ вершинѣ, чѣмъ на внутреннемъ. Относится къ блѣдной сѣверной формѣ. Длина крыла 182 mm.

1) Ibis, 1899, p. 298.

2) OUSTALET, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, p. 56.