

191. *Oenoporrelia humilis* (Темм.).

с. 5000'. ♀ adlt., 21. IX. 1901, ключ. Сяо-шао-ба-шуй, южн. Ала-шань.

«Одиночный экземпляръ этой мелкой горлицы былъ встрѣченъ нами въ долинѣ, несшей хотя и переходный къ пустынѣ, но все-таки еще хорошій луговой характеръ», на ключѣ Сяо-шао-бай-шуй, уже въ предѣлахъ Алашаньской пустыни, но недалеко отъ подошвы Нань-шаня.

Мѣстонахожденіе этого экземпляра представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что связываетъ мѣстонахожденія Н. М. Пржевальскаго, который нашелъ эту горлицу съ одной стороны въ половинѣ іюня 1873 г. гнѣздящейся въ паркѣ алашаньскаго князя въ городѣ Дынъ-юань-инъ (Фу-ма-фу) всего въ числѣ одной пары, а съ другой — въ сентябрѣ 1884 въ южномъ Цайдамѣ на рѣкѣ Номохунъ-голь, гдѣ она была довольно обыкновенна. Такимъ образомъ нормальное распространіе этого вида простирается къ сѣверо-западу дальше, чѣмъ свидѣлствуетъ David, говорящій, что онъ нигдѣ не переходитъ Желтую рѣку къ сѣверу. Въ бассейнѣ верхняго теченія Голубой рѣки ее нашелъ М. М. Березовскій въ первое путешествіе у города Чэнь-сяня, а во второе въ сѣверо-западной Сы-чуани — въ Ся-цхо-ванѣ близъ Сунь-паня. Возможно, что *Oen. humilis* распространяется и еще дальше къ сѣверу; по крайней мѣрѣ на это указываютъ два вѣроятно залетныхъ экземпляра, изъ которыхъ одинъ былъ добытъ г. Валицкимъ у Нерчинскаго завода въ Забайкальѣ, а другой на островѣ Аскольдѣ въ Южно-Уссурійскомъ краѣ.

Я вполне присоединяюсь къ мнѣнію BLANFORD'a<sup>1)</sup>, выдѣлившаго эту горлицу въ особый родъ *Oenoporrelia*, но не согласенъ съ нимъ въ томъ, что онъ соединяетъ *Oen. humilis* съ *Oen. tranquebarica*. У послѣдней только нижнія кроющія маховъ перваго разряда сѣрыя, нижнія же кроющія маховъ второго разряда и подмышечныя бѣлыя, тогда какъ у *Oen. humilis* всѣ нижнія кроющія и подмышечныя сѣрыя — перваго разряда темныя, второго — свѣтлыя. Признакъ этотъ постояненъ и потому нѣтъ никакой причины видѣть въ *Oen. humilis* лишь подвидъ. Области распространенія двухъ видовъ различны. *Oen. tranquebarica* свойственна передней Индіи отъ Синда и Раджпутаны до Непала и Сиккима на сѣверѣ и Цейлона на югѣ. *Oen. humilis* распространена отъ Цайдама и Ала-шаня на сѣверѣ и отъ Качара, Бурмы и Андаманскихъ острововъ на югѣ по всей южной части Китая и Индокитая до Шанхая и Филиппинскихъ острововъ. Нахожденіе

1) Faun. Brit. Ind., Birds, IV, p. 47 (1898).