

ея въ Японіи зиждется на одномъ экземплярѣ, добытомъ въ Іокогамѣ на рынкѣ.

Сем. Pteroclididae.

192. *Syrrhaptes paradoxus* (PALL.).

с. 6000'. ♂, 2 ♀ adlt., нач. ІХ. 1899, дол. р. Ботогонъ-голь, сѣв. предг. Гобійскаго Алтая.

с. 4000'. ♂, ♀ adlt., X. 1901, средняя Гоби.

«Бульдюрुकъ сталъ встрѣчаться намъ тотчасъ по вступленіи въ бассейнъ Кобдо и во время слѣдованія по нижней дорогѣ къ городу того же имени. Еще многочисленнѣе попадалась эта птица по долинамъ Кара-усу и Тугюрюка, а также Ботогонъ-гола» (Ботхонъ-коль), въ верховьѣ р. Цинхирь, впадающей съ юга въ озеро Кара-усу. «Здѣсь птицы прилетали по утрамъ на водопой сотенными стадами. Далѣе бульдюрукъ встрѣчался очень часто на всемъ пути вдоль сѣверной подошвы Гобійскаго Алтая. Однако нигдѣ онъ не попадался намъ такими массами, какъ въ обширной долині Шягры-цаганъ-норъ; тутъ птицы считались уже не сотнями, а тысячами. Въ концѣ сентября и началѣ октября *S. paradoxus* летѣли стадо за стадомъ къ востоку.

«У колодезя Чагеринъ-худукъ», гдѣ экспедиція повернула прямо на югъ, «13 ноября я услышалъ сильный ударъ въ дверь моей юрты. Шумъ произошелъ отъ налета сокола, выпустившаго при этомъ изъ когтей бульдюрука, который успѣшилъ затѣмъ скрыться въ юрту. На сокола накинулась стая постоянныхъ посѣтителей нашего бувуака — воронъ и угнала хищника. Бульдюрुकъ, лишившійся хвоста, скоро оправился и улетѣлъ съ обычнымъ крикомъ».

193. *Syrrhaptes tibetanus* GOULD.

с. 11.000'. 3 ♂, 2 ♀ adlt., к. ІІІ. 1900, котловина оз. Куку-норъ.

«Тибетскій бульдюрукъ встрѣченъ нами только однажды, именно на пути слѣдованія вдоль сѣверо-западнаго берега оз. Куку-норъ, гдѣ онъ держался стадами штукъ по 10—15 въ сосѣдствѣ съ рѣчками, впадающими въ этотъ бассейнъ. На водопой птицы прилетали около полудня. На каменисто-галечной площади замѣтить птицъ очень трудно, такъ какъ опереніе ихъ вполне гармонируетъ съ этою почвою».

Экспедиція принца Г. Орлеанскаго и Бонвало добыла экземпляръ этого вида въ февралѣ 1893 г. у оз. Namtso (Тэнгри-норъ).