

Отрядъ Lariformes.

Сем. Laridae.

194. *Sterna fluviatilis fluviatilis* NAUM.

- с. 7000'. 2 pull. floccosi, 25. VII. 1899, оз. Халцзанъ, Укёкъ, Алтай.
 с. 7000'. 2 pull. semiflocc., VII. 1899, оз. Халцзанъ, Укёкъ, Алтай.
 с. 6000'. ♂ adlt., нач. VIII. 1899, верхн. теч. р. Кобдо, Алтай.
 4490'. ♀ juv. 1-а vest., II/2. VIII. 1899, р. Буяну у гор. Кобдо, Алтай.

У мелкихъ, покрытыхъ почти однимъ пухомъ птенцовъ изъ перьевъ отрастаютъ только рули и особенно махи. Крупные птенцы, тѣломъ почти уже со взрослыхъ, сохранили пуховой нарядъ лишь на головѣ и надхвостье, на туловищѣ же эмбриональныя перья уцѣлѣли лишь спорадически. Взрослая птица съ верхняго теченія р. Кобдо еще не начала линять, какъ и молодая съ р. Буяну.

«Наблюдалась въ теченіе лѣта и вездѣ гнѣздащейся какъ въ долинѣ рѣки Бухтармы и на плато Укёкъ, гдѣ на озерѣ Халцзанъ добыты птенцы различного возраста, такъ и въ системѣ р. Буяну подъ Кобдо».

Вѣроятно на озерѣ же Халцзанъ добыто и яйдо, находящееся въ коллекції экспедиціи.

П. К. Козловъ отмѣчаетъ въ дневникѣ, что на озерѣ Халцзанъ «было много труповъ *Sterna*, погибавшей отъ большого количества глистовъ».

195. *Sterna fluviatilis tibetana* SAUND.

- с. 13.000'. ♂ adlt., I/3. V. 1901, р. Да-чю, лѣв. притокъ Голубой рѣки.

На рѣкѣ Да-чю системы Голубой рѣки «весенній прилетъ этой крачки наблюдался 5 мая (1901), но возможно, что она прилетѣла уже и раньше».

Этотъ экземпляръ представляетъ типичную *St. tibetana*; верхъ тѣла (вся мантія), весь низъ къ заду отъ шеи и подмышечныя у него значительно темнѣе, чѣмъ напр. у птицы съ рѣки Кобдо.

196. *Chroicocephalus ridibundus* (LINN.).

- 3740'. ♂ semiadlt., 27—28. VIII. 1899, южн. берегъ оз. Кара-усу, Алтай.

«Наблюдалась въ очень маломъ количествѣ у озера Кара-усу».

Полувзрослый экземпляръ, частью смѣнившій прошлогодній молодой нарядъ на зимній; голова кромѣ затылка бѣлая съ черноватыми концами