

ушныхъ и передней окружностью глаза; затылокъ буроватый; на спинѣ преобладаетъ сѣрый цвѣтъ съ отдѣльными бурыми перьями, которыхъ больше всего на зашейкѣ; кроющія крыла и махи 3-го разряда бурые съ бѣловатыми кончиками; наружные махи перваго разряда на внутреннемъ опахалѣ съ длиннымъ бѣлымъ полемъ, прилегающимъ къ свѣтло-сѣрому стержню и идущимъ отъ основанія пера почти до его вершины; конецъ хвоста черновато-бурый; весь низъ чисто бѣлый, какъ и основныя  $\frac{3}{4}$  рулей и верхнія кроющія хвоста.

### 197. *Chroicocephalus brunneiceps* (JERD.).

13.370'. ♂ adlt. ptil. aest., ♀ semiadlt., 30. V. 1900, оз. Алыкь-норь у южн. подн. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.

14.580'. ♀ adlt. ptil. aest., 22. V. 1901, рѣч. Нацанъ-чю, прит. Магъ-мугъ-чю, сист. Дза-чю, прит. Голубой р., у южн. поднож. водораздѣла Голубой и Желтой рѣкъ.

Одинъ изъ экземпляровъ съ оз. Алыкь-норь взрослый самецъ въ брачномъ нарядѣ, другой — полувзрослая самка вѣроятно двухъ лѣтъ: все опереніе у нея какъ у старой птицы за исключеніемъ окраски головы, хвоста и маховъ перваго и втораго разрядовъ; голова не бурая, а бѣлая съ бурымъ теменемъ и затылкомъ; хвостъ на концѣ съ черной перевязью; первый махъ 1-го разряда весь бурый съ чернымъ (снизу сѣрымъ) стержнемъ; второй по четвертый бурые съ небольшимъ бѣлымъ пятномъ въ основной части наружнаго опахала; на слѣдующихъ бѣлый цвѣтъ увеличивается и распространяется на внутреннее опахало; самые внутренніе махи 1-го разр. отрастаютъ, замѣнившись уже сѣрыми, но махи втораго порядка еще бурые.

«Этихъ чаекъ было много по озеру Алыкь-норь».

Какъ взрослые, такъ и молодыя *Chroicocephalus brunneiceps* легко отличаются отъ *Chr. ridibundus* по окраскѣ первыхъ маховъ. У взрослой *Chr. ridibundus* первый махъ бѣлый съ узкой черной полоской (прикасающейся къ стержню, кромѣ очень старыхъ птицъ) вдоль большей части наружнаго опахала, съ черной вершиной и съ черноватымъ краемъ внутренняго опахала; второй махъ такой же, но полоска на наружномъ опахалѣ короткая и очень узкая; третій махъ такой же, но черный цвѣтъ вершины нѣсколько распространяется къ основанію пера по краю наружнаго опахала. У взрослой *Chr. brunneiceps* первый махъ черный за исключеніемъ округлаго бѣлаго пятна, занимающаго оба опахала предъ вершиной пера, и большаго или меньшаго бѣлаго поля у основанія пера; второй такой же, но бѣлое поле у основанія пера больше; третій безъ вершиннаго бѣлаго