

область гнѣздованія его находится въ западной части центральной Азіи. Въ нашемъ музеѣ есть экземпляръ отъ SCHLÜTER'a, добытый 1. IV. 1891 (вѣроятно по новому стилю, слѣдовательно 20. III по старому) въ Петровскѣ на западномъ берегу Каспійскаго моря; на основаніи этой даты дѣлать какое-либо предположеніе о свойствахъ пребыванія тутъ птицы невозможно; скорѣе всего она была пролетная. Но уже слѣдующіе экземпляры подтверждаютъ гнѣздованіе *S. geoffroyi* въ Арало-Каспійской низменности и въ Туркестанѣ: 11. VI. 1859 г. Сѣверцовъ добылъ самку въ Туркменіи на колодезѣ Бурнакъ; онъ же собралъ 13. VI молодого самца на Сыръ-Дарьѣ между Джидели-кудукъ и оз. Косъ-куль; далѣе, въ коллекціи его имѣются пять птицъ изъ Ферганы, именно: ♀, 18. V, Учъ-Курганъ; ♀, 10. VI, нижнее теч. Чичкона, ♂ и ♀, 18. V, между Наманганомъ и Чустомъ, и ♂, 26. V, Ашлыкъ-кишлакъ. Затѣмъ несомнѣнно гнѣздящуюся парочку добыли Никольскій<sup>1)</sup> и Зарудный<sup>2)</sup> близъ Чикишляра у юго-восточнаго угла Каспійскаго моря, гдѣ видъ этотъ былъ въ это время очень обыкновененъ и гнѣзвился. Наконецъ Н. А. Зарудный<sup>3)</sup> наблюдалъ его не только пролетнымъ, но и гнѣздящимся въ апрѣлѣ мѣсяцѣ во время обоихъ своихъ путешествій по восточной Персіи. Онъ долженъ гнѣздиться и въ Высокой Центральной Азіи, потому что П. К. Козловъ добылъ молодую птицу въ первомъ зимнемъ нарядѣ на среднемъ теченіи рѣки Кобдо въ самомъ началѣ августа; если птица эта была пролетная, а не мѣстная, то это указывало бы лишь на то, что она вывелась гдѣ-либо сѣвернѣе. Во время своего третьяго путешествія Пржевальскій добылъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ самку въ оазисѣ Черченъ, а въ августѣ того же года еще двухъ птицъ въ оазисѣ Сампула близъ Хотана. Въ болотахъ же подъ Хотаномъ добыла его въ сентябрѣ 1889 г. и экспедиція Пѣвцова. Къ востоку отъ меридіановъ Кобдо и Лобъ-нора пока никто, насколько мнѣ извѣстно, *S. geoffroyi* въ центральной Азіи не находилъ. Нахожденіе его, не говоря уже о гнѣздованіи, въ Японіи вообще сомнительно и основано всего на одномъ, очевидно залетномъ экземплярѣ, добытомъ WHITELY будто бы на этомъ архипелагѣ<sup>4)</sup>. Въ Китаѣ онъ извѣстенъ лишь съ побережья и встрѣчается тутъ повидимому только на пролетѣ<sup>5)</sup>, причѣмъ это могутъ быть птицы, гнѣздящіяся въ сѣверо-западной Монголіи. Предположеніе СЕЕВОИМ'a<sup>6)</sup> о гнѣздованіи его на островѣ Хай-

1) Труд. Спб. Общ. Естеств., XVIII, 1886, стр. 400.

2) Матер. позн. фаун. и флор. Росс. Имп., I, 1892, стр. 132.

3) Зап. Имп. Акад. Наукъ, (8) X, 1900, № 1, стр. 72. — Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ., XXXVI, i, 1902, стр. 63.

4) СЕЕВОИМ, В. Япон. Емп., p. 311. — HARTING, Ibis, 1870, p. 379.

5) DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 426.

6) Geogr. distr. Charadr., p. 147. — Ibis 1879, p. 154.