

- a. На всѣхъ или на нѣкоторыхъ изъ боковыхъ рулей черная перевязь передъ рѣзко очерченными бѣлымъ или бѣловатымъ концомъ.
- b. Подмышечныя сѣрыя или дымчатая. (Ноги черныя. Средній палецъ безъ когтя значительно длиннѣе половины длины плюсны). — У старыхъ птицъ въ лѣтнемъ нарядѣ зобъ сѣро-бурый съ бѣлымъ пояскомъ на границѣ груди, грудь и бока тѣла коричневые, брюхо черное. Въ зимнемъ нарядѣ зобъ сѣровато-бурый, остальной низъ грязно- или солово-бѣлый. У молодыхъ птицъ зобъ въ бурыхъ наствольяхъ, спина и лопаточныя въ рѣзкихъ рыжихъ ободкахъ. — Гнѣздится въ тундрѣ отъ Атлантическаго до Тихаго океана, на югѣ въ горныхъ странахъ; зимуетъ въ области Средиземнаго моря. Въ Амурскомъ краѣ, Китаѣ и Индіи не встрѣчается.  
**Eudromias morinellus.**
- b'. Подмышечныя бѣлыя, развѣ съ легкимъ сѣрымъ оттѣнкомъ. — У старыхъ птицъ въ лѣтнемъ нарядѣ самая передняя часть лба, уздечки, перья подъ глазомъ и большая часть ушныхъ, полоса поперекъ задней части лба и ошейникъ вокругъ зоба и зашейка чернаго цвѣта. Въ зимнемъ нарядѣ верхъ головы почти одноцвѣтный, остальныя черныя отмѣтины замѣнены бурыми. У молодыхъ птицъ нарядъ какъ зимній старыхъ, но перья верха тѣла съ рѣзкими блѣдными оторочками. — Ноги всегда желтыя.
- c. Внутренніе махи 1-го разр. по срединѣ съ бѣлой полосой, занимающей не менѣе половины ширины наружнаго опахала. — У старыхъ птицъ въ лѣтнемъ нарядѣ основная часть верхней челюсти, какъ и нижней, оранжевая, но въ зимнемъ нарядѣ и у молодыхъ верхняя челюсть вся темная.
- d. И внутренній, и наружный пальцы соединены со среднимъ явственно развитыми перепонками; между наружнымъ и среднимъ пальцами конецъ перепонки доходитъ до II фаланги. — Въ остальномъ не отличимъ отъ *Aeg. hiaticula*. Крыло 118.5—127.5 мм. — Американскій видъ, найденный на азіатскомъ берегу Берингова пролива.  
**Aegialeus semipalmatus.**
- d'. Между внутреннимъ и среднимъ пальцами развѣ намекъ на перепоночку, а между наружнымъ и среднимъ послѣдняя доходитъ до первой фаланги пальца. Крыло 121—140 мм. — Отъ Гренландіи, Исландіи и Шпицбергена по всей Европѣ и Азіи до Анадыря; зимуетъ въ Африкѣ; въ Амурскомъ краѣ и Китаѣ не найденъ, въ сѣв.-зап. Индіи случайно.  
**Aegialites hiaticola.**
- c'. Внутренніе махи 1-го разряда по наружному опахалу одноцвѣтные или съ очень узкой бѣлой полоской у стержня. Только основаніе нижней челюсти желтое.
- e. Крыло длиннѣе 125 мм. (133—143). Крайніе рули короче среднихъ болѣе, чѣмъ на 9 мм. — Отъ Южно-Уссурийскаго края, Японіи, Кореи и Манчжуріи по Китаю и Гималаю до Качара, Ассама и Непала.

**Aegialites placidus.**

довъ, но съ одной стороны охарактеризовалъ ихъ въ своихъ синоптическихъ таблицахъ часто совершенно неправильно, а съ другой — помѣстилъ различные виды въ роды, къ которымъ они не принадлежатъ. Такъ, родъ *Eudromias* охарактеризованъ имъ признакомъ, не имѣющимъ фактической подкладки: «tibia feathered nearly to the tibio-tarsal joint», а родъ *Ochthodromus*: «bill stout, or moderately so; culmen about equal to the length of the middle toe and claw». При этой характеристикѣ рода *Ochthodromus* (типъ *Charadrius wilsoni*) авторъ помѣщаетъ въ него чрезвычайно тонкоклювыхъ *Charadrius veredus* GOULD и *Charadrius asiaticus* PALLAS, которые тотчасъ же выдѣляются кромѣ того своею очень длинною ступнею и въ дѣйствительности относятся къ роду *Podosocys*. — *Charadrius alexandrinus* LINN. (*Ch. cantianus* LATR.) несомнѣнно родственнѣе *Ch. mongolus* PALL., *Ch. pyrrhothorax* GOULD и *Ch. geoffroyi* WAGLER, чѣмъ *Aegialites hiaticula*, *Aeg. placida* и *Aeg. dubia*, а потому я помѣщаю первыхъ въ родъ *Cirrepidestmus* BONAP., который удерживаю до детальнаго изученія родственныхъ отношеній между экзотическими и палеарктическими зуйками.