

e' Крыло короче 125 мм. (109.5—120). Крайніе рули короче средних менѣе, чѣмъ на 9 мм. Отъ Атлантическаго до Тихаго океана за исключеніемъ крайняго сѣвера; зимою отъ южной Африки до Новой Гвинеи. — *Aeg. minor*, *Aeg. cingonicus*. *Aegialites dubius*.

a'. Боковые рули становятся лишь нѣсколько темнѣе передъ бѣлымъ или бѣловатымъ концомъ, но безъ рѣзкой черной перевязи.

f. Средній палецъ безъ когтя откладывается въ плюснѣ (отъ ямки на задней сторонѣ голенно-стопнаго сочлененія до конца средняго метатарзальнаго отростка) почти полныхъ два раза. Ноги у старыхъ птицъ желтыя, у молодыхъ желтоваты или по крайней мѣрѣ блѣдно-черноватыя. (Клювъ тонкій, наибольшая высота его не больше 4.5 мм.).

g. Подмышечныя бурыя. Наружное опахало крайнихъ рулей бѣлое. Крупнѣе: крыло 158—165 мм., плюсна длиннѣе 40 мм. — У стараго ♂ въ брачномъ нарядѣ преобладающій цвѣтъ головы и шеи бѣлый, блѣдно-бураго цвѣта лишь темя и затылокъ; зобъ ярко-рыжій, на границѣ съ нижней грудью довольно широкой черный поясокъ; у ♀ большая часть верха головы бурая, зобъ рыжеватый, черный поясокъ замѣненъ рыжевато-бурымъ. Въ зимнемъ нарядѣ бѣлаго полушеяника на зашейкѣ нѣтъ, зобъ бурый, къ бокамъ темнѣе. Молодые птицы отличаются отъ взрослыхъ въ зимнемъ нарядѣ свѣтлыми ободками на перьяхъ верха тѣла. — Гнѣздится въ Монголіи, зимуетъ отъ Явы до Австраліи; вѣроятно залетный экз. добытъ подъ Самаркандомъ. *Podococys veredus*.

g'. Подмышечныя бѣлыя. Большая часть наружнаго опахала крайнихъ рулей бурая. Мельче: крыло 137.5—151 мм., плюсна короче 40 мм. — У стараго самца въ брачномъ нарядѣ, какъ и у самки, лишь передняя часть лба бѣлая, остальной же верхъ головы и зашеекъ бураго цвѣта, такъ что бѣлаго полушеяника на задней сторонѣ шеи нѣтъ; зобъ ярко-рыжій съ болѣе или менѣе развитымъ чернымъ пояскомъ по задней границѣ, у ♀ буровато-рыжій безъ чернаго пояса. Въ зимнемъ нарядѣ и молодые какъ у *P. veredus*. — Гнѣздится въ Ишимской и Киргизскихъ степяхъ отъ бассейна Урала до Семирѣчья и въ Туркестанѣ; зимуетъ отъ восточной Африки до Персидскаго залива; въ Индіи лишь залетный. — *P. caspius*.

*Podococys asiaticus*.

f'. Средній палецъ безъ когтя замѣтно или значительно длиннѣе половины длины плюсны. Ноги всегда черныя.

h. На зашейкѣ нѣтъ узкаго, но рѣзко ограниченнаго, чисто-бѣлаго полушеяника. Крыло не короче 120 мм.

i. Клювъ толстый, высота его въ области наибольшаго вздутія конечной дуги (dertrum) и угла нижней челюсти не меньше 5.25 мм.; длина конечной дуги по хордѣ минимумъ 9.0 мм.; обнаженный culmen минимумъ 19.5 мм. — У ♂ въ брачномъ нарядѣ полоса поперекъ средней части лба, уздечки, перья подъ глазомъ и ушныя черныя, зобъ ярко-рыжій, на зашейкѣ широкий блѣдно-рыжій полушеяникъ, у ♀ черныя участки головы замѣнены бурыми, рыжій цвѣтъ зоба грязнѣе. Зимній нарядъ обоихъ половъ, какъ у лѣтней самки, но зобъ чисто-бѣлый. У молодыхъ перья верха тѣла съ рѣзкими блѣдными ободками. Крыло 131.5—150.5 мм. — Отъ сѣв.-зап. Монголіи до Каспійскаго моря; зимуетъ отъ восточной Африки до восточной Австраліи.

*Cirripidesmus geoffroyi*.

i'. Клювъ тонкій, высота тамъ же не больше 4.5 мм.; длина конечной дуги по хордѣ максимумъ 9.0 мм.; обнаженный culmen максимумъ 19.0 мм. — Наряды какъ у *C. geoffroyi*, съ которымъ схожъ въ остальномъ.