

*к.* Преобладающій цвѣтъ лба въ брачномъ нарядѣ бѣлый, такъ какъ бѣлыя пятна по бокамъ оперенной части *culmen*'а развиты очень сильно и оставляютъ черной только полосу вдоль *culmen*'а. Ошейникъ на zobу темнаго коричневаго цвѣта. — Въ остальномъ и зимой не отличимъ отъ *C. pyrrhothorax*. Крыло 122—136 mm. — Восточная Сибирь отъ Забайкалья и Амурскаго края до Сахалина, Курильскихъ и Командорскихъ острововъ и Аляски.

*Cirripidesmus mongolus mongolus.*

*к'.* Преобладающій цвѣтъ лба черный, такъ какъ бѣлыя пятна по бокамъ оперенной части *culmen*'а развиты очень слабо и вдоль *culmen*'а остается очень широкая черная полоса. Ошейникъ на zobу блѣднаго коричневаго цвѣта. Крыло 120—133 mm. — Высокая центральная Азія.

*Cirripidesmus mongolus pyrrhothorax.*

*н.* На зашейкѣ узкій, но рѣзкій чисто-бѣлый полуошейникъ во всѣхъ нарядахъ. Крыло короче 120 mm. — У ♂ въ брачномъ нарядѣ уздечки, по крайней мѣрѣ часть перьевъ подъ глазомъ и ушныхъ, перевязь по задней части лба и по пятну съ каждой стороны zobа чернаго цвѣта, остальной верхъ головы и зашеекъ до бѣлаго полуошейника ярко-рыжіе; у ♀ черные участки замѣнены свѣтло- или рыжевато-бурыми, рыжій цвѣтъ верха головы довольно ярокъ лишь возлѣ бѣлаго полуошейника на зашейкѣ. Зимній нарядъ напоминаетъ нарядъ самки, но еще бурѣе. Молодые птицы какъ зимнія, но перья всего верха въ очень рѣзкихъ рыжихъ ободкахъ и каймахъ. Крыло 104.5—117 mm. — Отъ Азорскихъ и Канарскихъ о-вовъ по Средиземноморской области и центральной и южной Азіи до Забайкалья, Уссурійскаго края, Японіи и Китая; зимою отъ Африки до Австраліи. — *C. cantianus.*

*Cirripidesmus alexandrinus.*

Настоящія ржанки отличаются отъ зуйковъ, къ которымъ ближе глупая ржанка (*Eudromias marinellus*), тѣмъ, что хвостъ у нихъ поперечно полосатый или на руляхъ имѣются по крайней мѣрѣ слѣды свѣтлыхъ полосъ въ видѣ ряда желтыхъ пятенъ у края обоихъ опахалъ. Въ лѣтнемъ нарядѣ у настоящихъ ржанокъ низъ тѣла отъ уздечки и ушныхъ до задняго конца груди черный. Въ зимнемъ нарядѣ низъ тѣла бѣлый. Молодые походятъ на зимнихъ стариковъ, но zobъ въ бурой пестринѣ, а верхъ тѣла съ большимъ количествомъ округлыхъ желтыхъ пятенъ. Четыре формы, водящіяся въ центральной и восточной Азіи, легко различить такъ:

*а.* Слабо развитый задній палець. Подмышечныя черны. — Гнѣздится въ тундрѣ Европы, Азіи и Америки; зимою циркумтропича. *Squatarola helvetica.*

*а'.* Задняго пальца вовсе нѣтъ.

*б.* Подмышечныя сѣрыя.

*с.* Крунѣе, махи 3-го разряда короче: крыло 191—173 mm., разстояніе отъ конца самаго длиннаго маха 3-го разр. до конца крыла 33—58 mm. — Отъ Аляски до Гренландіи; зимою до Чили и Буэносъ-Айреса.

*Charadrius dominicus dominicus.*

*с'.* Мельче, махи 3-го разр. длиннѣе: крыло 173—153 mm., разстояніе между концами маховъ 3-го и 1-го разр. 13—21 mm. — Восточная Сибирь отъ Енисея; зимою до Индіи, Малайскаго архипелага, Полинезіи и Австраліи.

*Charadrius dominicus fulvus.*

*б'.* Подмышечныя бѣлыя. Крыло 173—190. Отъ Шотландіи до Енисея; зимою въ области Средиземнаго моря. *Charadrius pluvialis.*