

Наконецъ, со ржанками и зуйками большинство путешественниковъ смѣшиваетъ камнешарку (*Arenaria s. Strepsilas interpres*), которая легко отличается формой клюва, не имѣющаго конечной дуги (dertrum) на концѣ верхней челюсти; клювъ у камнешарки въ общемъ конусообразный и слегка направленъ (вѣрнѣе скошенъ) вверхъ, а не загибается кончикомъ внизъ.

206. *Ibidorhynchus struthersi* Vig.

4820'. 2 ♀ adlt., 18—20. I. 1900, оаз. Лянъ-чжоу, сѣв. подн. Нань-шаня.
9120'. ♂, ♀ adlt., II/2. III. 1900, кум. Дацанъ-сумэ, къ з. отъ Дань-гэръ-тина, юг.-вост. Нань-шань.

«Стайка изъ четырехъ серпоклювокъ держалась среди оазиса по быстрой рѣчкѣ, бѣгущей по каменистому грунту крутой балки. Во время дальнѣйшаго слѣдованія черезъ Нань-шань птица эта встрѣчалась почти на каждой быстро текущей рѣчкѣ, но всегда обособленными парами». У кумирни Дацанъ-сумэ къ западу отъ Дань-гэръ-тина (Донкыръ), на южномъ склонѣ Нань-шаня, добыта пара «въ половинѣ марта, когда яичники были уже сильно развиты».

207. *Numenius arquatus lineatus* Cuv.

3740'. ♀ adlt., 28. VIII. 1899, южн. бер. озера Кара-усу, Алтай.

«Кроншнепъ встрѣчался изрѣдка въ бассейнѣ рѣки Кобдо. На озерѣ Кара-усу былъ тоже рѣдокъ; нѣсколько чаще попадался вдали отъ этого озера на старыхъ пастищахъ, расположенныхъ на границѣ пустыни и болотистой мѣстности».

Типичный *N. lineatus*, такъ какъ вся нижняя спина, надхвостье и подмышечныя чисто бѣлые; только нѣкоторыя изъ верхнихъ кроющихъ хвоста съ болѣе или менѣе широкими бурыми продольными наствольями.

208. *Limosa limosa* LINN.

с. 6000'. ♀ adlt., нач. VIII. 1899, р. Суокъ или верхн. теч. р. Кобдо, Алтай.
с. 11.000'. ♀ adlt., II/3. VIII. 1901, оз. Куку-норъ.

Крыло у обоихъ экземпляровъ равняется 203 mm., плюсна у первого 71, у второго 73.5 mm.; такимъ образомъ эти птицы могутъ быть отнесены съ одинаковымъ правомъ какъ къ типичной формѣ, такъ и къ *L. limosa melanuroides*.

«Въ долинѣ рѣки Суока гнѣздился».