

209. *Glottis nebularius* (Gunn.).

Судя по замѣткѣ въ дневникѣ подѣ *Ravoncella rugosax*, этотъ видъ встрѣтился П. К. Козлову 5 сентября на рѣчкѣ Борджонъ-голь, въ хребтѣ Алтайнъ-нуру, системы Гобійскаго Алтая, гдѣ онъ держался вмѣстѣ съ турухтаномъ на рукавѣ названной рѣчки (6540').

210. *Totanus calidris* (Linn.).

- с. 5500'. ♂ adlt., кон. VIII. 1899, средн. теч. рѣки Кобдо, Алтай.
 9630'. ♀ adlt., 10—11. IV. 1890, болот. Иргицыкъ, вост. Цайдамъ.
 с. 13.000'. ♀ adlt., 1/3. V. 1901, р. Дза-чю, лѣв. прит. Голубой рѣки.
 с. 9000'. ♂ adlt., 1/3. VIII. 1901, юго-восточный Цайдамъ.

«Встрѣчался то часто, то рѣдко на всемъ пути отъ станицы Алтайской до средняго теченія Кобдо и гнѣздится тутъ; въ присутствіи человѣка птицы громко кричали и кружились около охотника», что указываетъ на нахожденіе птенцовъ поблизости.

«На весеннемъ пролетѣ наблюдался 9 апрѣля въ сѣверо-восточномъ Цайдамѣ. У болота Иргицыка были очень обыкновенны и держали себя очень довѣрчиво; наблюдались какъ отдѣльными парами, такъ и стайками особей въ 15—20».

211. *Helodromas ochropus* (Linn.).

- с. 5500'. ♂ adlt., нач. VIII. 1899, средн. теч. рѣки Кобдо, Алтай.
 4820'. ♀ adlt., 1/3. I. 1890, оаз. Лянъ-чжоу у сѣв. подн. Нань-шаня.
 с. 12.500'. ♀ adlt., 21. VIII. 1900, рѣч. Ба-чю, впад. въ Цзанъ-да, прит. Ды-чю (Голубой).

«Куликъ-чернышъ попадался вездѣ на нашемъ пути по Алтаю, гдѣ только былъ мокрый лугъ, небольшое озеро или даже лужа. Тотчасъ узнается по своему темному цвѣту и бѣлому надхвостью. Если по близости нѣтъ другого пріюта, то птичка, быстро взлѣтѣвъ и покружившись вокругъ охотника, снова опускается къ своему болотцу.

«Далѣе встрѣченъ зимующимъ по рѣчкѣ оазиса Лянъ-чжоу, несшей свѣтлую воду по открытой, каменистой мѣстности. Тутъ держалось въ разныхъ мѣстахъ около 6 штукъ».

212. *Tringoides hypoleucus* (Linn.).

- 3480'. ♂, ♀ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.
 10.910'. ♂ juv. 1-a vest. hiem., ♀ adlt., 19. VII. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда.