

«Гнѣзился по р. Сарымъ-сакты у станицы Алтайской, гдѣ отдѣльныя парочки держались обособленно отъ другихъ. Встрѣчался и на всемъ остальномъ пути по южному Алтаю».

213. *Terekia cinerea* (GÜLDENST.).

с. 7000'. ♂ adlt., 25. VII. 1899, оз. Халцзанъ, плато Укѡкъ, Алтай.

«Одиночная парочка наблюдалась на южномъ берегу озера Халцзанъ».

214. *Pavoncella pugna* (LINN.).

6540'. ♂ adlt. ptil. hiem., 5. IX. 1899, рѣч. Борджонъ-голь, хреб. Алтайнъ-нуру, Гобійскій Алтай.

«Одинокая, вѣроятно пролетная птица держалась по рѣчкѣ Борджонъ-голь вмѣстѣ съ *Glottis nebularius* на мокрой лужайкѣ, по которой протекалъ рукавъ этой прозрачной, каменистой рѣчки. Выстрѣломъ турухтанъ былъ убитъ, а травникъ раненъ; послѣдній оправился и улетѣлъ».

215. *Limonites temmincki* (LEISL.).

с. 5000'. ♀ adlt. ptil. aestiv., 8. VIII. 1899, дол. р. Хашуту, прит. нижн. Кобдо, Алтай.

с. 6000'. ♀ juv. 1-a vest. hiem., 31. VIII. 1899, ур. Талынъ-хара, Алтайнъ-нуру, Гоб. Алтай.

с. 13.000'. ♂ adlt. ptil. aestiv., 1/3. V. 1901, рѣка Дза-чю, лѣв. прит. Голубой рѣки.

Самка съ р. Хашуту въ сильно обношенномъ лѣтнемъ нарядѣ, почти безъ слѣдовъ рыжихъ ободковъ на перьяхъ верха тѣла, которыхъ еще много у майскаго самца.

«Куличекъ-воробей сталъ попадаться намъ изрѣдка при спускѣ съ перевала Уланъ-дабанъ по рѣкамъ Оргой, Суокъ, Кобдо и ея небольшимъ горнымъ притокамъ, лежащимъ на большомъ пути въ городъ Кобдо. Затѣмъ парочка этихъ птицъ ютилась на почти высохшемъ озерѣ Шара-норъ¹⁾ въ урочищѣ Талынъ-хара въ хребтѣ Алтайнъ-нуру.

«Наконецъ, куличекъ этотъ попадался намъ кое-гдѣ въ долинѣ рѣки Дза-чю, лѣваго притока Голубой рѣки въ маѣ 1901 г.»

1) Это «озеро» не обозначено даже на 20-ти верстной картѣ экспедиціи.