

216. *Gallinago solitaria* HODGS.

- 4820'. ♂ adlt., II/2. I. 1900, оазисъ Лянъ-чжоу, сѣв. подн. Нань-шаня.
 11.960'. ♀ adlt., кон. XII. 1900, р. Рэ-чю лѣв. прит. Меконга.
 11.960'. ♀ adlt., 17—18. IV. 1901, рѣч. Дэнъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой
 рѣки.

У самки, добытой въ системѣ Голубой рѣки въ апрѣлѣ, полосы по лопаточнымъ не чисто-бѣлыя, а бѣловато-соловья, лишь мѣстами почти бѣлыя; въ общемъ она всюду нѣсколько рыжѣе остальныхъ двухъ птицъ. Длина крыла этихъ трехъ экземпляровъ 155.0, 155.0 и 161.0 mm.

«Въ оазисѣ Лянъ-чжоу держался по близости каскада на запрудѣ рѣчки, быстро текущей по крутой каменистой балкѣ. Затѣмъ найденъ зимующимъ въ ущельи рѣчки Рэ-чю въ концѣ декабря 1900» и въ половинѣ апрѣля 1901 на небольшомъ притоцѣ Дза-чю — Дэнъ-чю.

217. *Gallinago megala* SWINH.

- с. 8000'. ♂ adlt., 30—31. VII. 1899, р. Ойгоръ, верхов. р. Кобдо, Алтай.

Несомнѣнно къ этому виду¹⁾ относится слѣдующая замѣтка въ дневникѣ П. К. Козлова. «Найденъ нами на пути въ заросли дэрэсуна (*Lasiagrostis*). Я съ Телешовымъ подъѣхали къ птицѣ вплотную и только тогда, тяжело поднявшись, она отлетѣла саженъ на 130 и снова опустилась въ траву. Рѣка Ойгоръ отстояла къ югу версты на 2—4 и столько же было вообще до ближайшей воды. Птица оказалась очень жирной».

Нахожденіе этого вида, свойственнаго Забайкалью и вообще юго-восточной Сибири, такъ далеко на западѣ представляетъ большой интересъ.

218. *Gallinago gallinago* (LINN.).

- 3180'. ♂ adlt., 24. IX. 1899, р. Шаргинъ-голь, прит. оз. Шаргинъ-цаганъ-норъ, Гобійскій Алтай.
 4820'. 2 ♂ adlt., II/2. I. 1900, оаз. Лянъ-чжоу у сѣв. подн. Нань-шаня.
 8820'. ♀ adlt., 16. IX. 1901, гор. Сунъ-шань-чэнъ, Нань-шань.

«Долина рѣки Шаргинъ-голь, гдѣ была добыта первая изъ перечисленныхъ птицъ, очень богата ключами, покрыта пышной растительностью и значительно теплѣе окружающей мѣстности.

1) Онъ помѣченъ № 66 и подъ этимъ же № первая замѣтка въ дневникѣ; остальные шкурки, *G. gallinago*, не помѣчены №№.