

«Въ оазисѣ Лянъ-чжоу найденъ зимующимъ и держался по незамерзающимъ источникамъ. Въ тихія, теплыя ночи леталъ, издавая обычные звуки».

Различныя формы группы *Scolopaceae* (вальдшнепы, дупеля, бекасы, гаршнепы и золотые кулики) часто смѣшиваются путешественниками, а потому слѣдующій обзоръ всѣхъ палеарктическихъ формъ кажется мнѣ не лишнимъ:

a. Плюсна короткая приблизительно равна длинѣ culmen'a и короче средняго пальца съ когтемъ. Клювъ на концѣ замѣтно расширенъ, въ морщинкахъ, но въ общемъ не загнутъ внизъ. Окраска половъ одинаковая.

b. Голень оперена до сочлененія. Темный рисунокъ верха головы поперечный и расположенъ лишь на темени и затылкѣ. Нѣкоторые изъ рулей съ серебристо-бѣлыми кончиками. Крыло больше 175 мм. — Отъ Атлантическаго до Тихаго океана, къ югу до Канарскихъ о-вовъ, Альповъ, Кавказа, Гималаевъ и Японіи; сѣверныя птицы зимуютъ въ средиземноморской области, Индіи и Китаѣ.

Scolopax ruslicola.

b'. Голень болѣе или менѣе обнажена передъ сочлененіемъ. Темный рисунокъ верха головы продольный и начинается почти отъ клюва.

c. Рулей не меньше 14. Крупнѣе: крыло длиннѣе 120, culmen больше 50, плюсна больше 25 мм. Спина и надхвостье, какъ и внутреннія опахала лопаточныхъ, безъ металлическаго блеска. На головѣ три свѣтлыхъ полосы, срединная свѣтлая. (Задній край грудной кости лишь съ двумя вырѣзками).

d. Вся нижняя часть груди и брюхо въ темныхъ поперечныхъ полосахъ. Разстояніе между самымъ короткимъ махомъ 2-го (не третьяго) разряда и самымъ длиннымъ 1-го разр. не превосходитъ 51 мм. — Лопаточныя въ интенсивно-рыжихъ полосахъ. Рулей 18, изъ нихъ по 4 съ каждой стороны узкіе (3—8 мм.). Крыло около 140—145 мм. — Гималаи отъ Непала до Ассама, 7.000—12.000 фут.

Gallinago nemoricola.

d'. Нижняя часть груди и брюхо по крайней мѣрѣ по срединѣ безъ поперечныхъ полосъ. Разстояніе между самымъ короткимъ махомъ 2-го и самымъ длиннымъ 1-го разр. болѣе 51 мм.

e. Рулей 18—26, причемъ съ каждой стороны хвоста отъ 2 до 8 рулей уже 8 мм.

f. Крупнѣе, крыло 153—173 мм. Рулей 18, изъ нихъ не шире 8 мм. не болѣе какъ по 5 съ каждой стороны.

g. Наружное опахало перваго маха 1-го порядка по крайней мѣрѣ со слѣдами свѣтлой поперечной пестрины; три первыхъ маха съ довольно явственными свѣтлыми каемочками на наружномъ опахалѣ. Лопаточныя съ бѣлыми или по крайней мѣрѣ бѣловатыми, слегка соловыми продольными полосами. Изъ 18 рулей по пяти съ каждой стороны узкіе (4—8 мм.).

h. Нижняя часть груди бѣлая безъ поперечныхъ полосъ. Свѣтлыя полосы на верхней сторонѣ тѣла широки. — Отъ Алтая и Туркестана до юго-восточной Сибири, къ югу до Гималаевъ — отъ Афганистана до Ассама, 9.000—15.000 фут.; осѣдель.

Gallinago solitaria.