

*h'*. Нижняя часть груди бѣлая въ бурыхъ поперечныхъ полоскахъ. Свѣтлыя полосы верха тѣла очень узки. — Сахалинъ, Японія и м. б. юго-восточная Сибирь.

*Gallinago solitaria japonica.*

*g'*. Наружное опахало перваго маха безъ слѣдовъ свѣтлой поперечной пестрины и только его наружное опахало съ болѣе явственной свѣтлой каемочкой. Лопаточныя съ рыжими продольными полосами. Изъ 18 рулей лишь по два съ каждой стороны уже 8 мм. — Японія; зимою до Австраліи и Тасманіи.

*Gallinago australis.*

*f'*. Мельче, крыло 125—143 мм. Рулей 20—26, изъ нихъ не меньше 6 съ каждой стороны уже 8 мм. и очень упруги.

*i*. Рулей 20, по 6 съ каждой стороны уже 8 мм. — Отъ сѣв.-зап. Монголіи до юго-вост. Сибири и Иессо; зимою до Малайскаго архипелага.

*Gallinago megala.*

*i'*. Рулей 26, по 8 съ каждой стороны уже 5.25 мм. (крайній лишь 1.5, восьмой всего 3 мм.). — Восточная Сибирь до Енисея; зимою отъ Индостана и Цейлона до Китая и Зондскихъ о-вовъ.

*Gallinago stenura.*

*e'*. Рулей не больше 16, крайніе не уже 10 мм.

*k*. Преобладающій цвѣтъ 4 крайнихъ паръ рулей бѣлый; у старыхъ птицъ конечная половина этихъ рулей чисто бѣлая, безъ поперечныхъ полосъ, у молодыхъ она въ поперечныхъ полоскахъ, но основной цвѣтъ ихъ все-же почти чисто бѣлый. Нормальное число рулей 16. Обыкновенно нѣсколько крупнѣе: крыло 144—135. (Слѣпыя кишки длиною 5—7 мм.). — Отъ Скандинавіи до Енисея; зимою въ области Средиземнаго моря и Африкѣ до Капской колоніи; не извѣстенъ въ Индіи.

*Gallinago major.*

*k'*. Преобладающій цвѣтъ 4 крайнихъ паръ рулей каштаново-соловый, въ темныхъ поперечныхъ полоскахъ, только развѣ самая крайняя пара съ нѣсколько большимъ количествомъ бѣлаго. Нормальное число рулей 14, рѣже 16. Обыкновенно немного мельче: крыло 135—127. (Слѣпыя кишки длиною 25—35 мм.). — Отъ Атлантическаго до Тихаго океана; зимою до сѣв. Африки, Индіи, Китая и Филиппинскихъ о-вовъ.

*Gallinago gallinago.*

*c'*. Рулей 12. Мельче: крыло 102—115, culmen 41—47.5, плюсна 19—25 мм. Спина и надхвостье съ пурпуровымъ, внутреннія опахала лопаточныхъ съ зеленымъ металлическимъ блескомъ, котораго у молодыхъ птицъ меньше. На верху головы лишь двѣ боковыхъ свѣтлыхъ полосы, средняя же темная (Задній край грудной кости съ четырьмя вырѣзками). — Отъ Атлантическаго до Тихаго океана; зимою отъ сѣв. Африки до Цейлона, Индокитая и Китая.

*Limnocyptes gallinula.*

*a'*. Плюсна длинная, почти равна длинѣ culmen'a и длинѣ средняго пальца съ когтемъ. Клювъ на концѣ не расширенъ, гладкій и чуть загнутъ обѣими челюстями книзу. Окраска половъ рѣзко различна, причемъ самка окрашена красивѣе самца. — На наружномъ опахалѣ восьмого маха 1-го разр. четыре соловыхъ пятна. Крыло около 127—140, culmen 47—51, плюсна 43—45 мм. У ♀ шея темно-каштановая, у ♂ буровато-сѣрая въ бѣлой пестринѣ. — Африка къ югу отъ Сахары, но до дельты Нила; вся Индія, но рѣдокъ въ Гималаяхъ отъ южнаго Афганистана до Сиккима и юго-восточнаго Тибета; весь Китай къ сѣверу до Ордоса, юго-восточной Монголіи, Кореи, южныхъ о-вовъ Японіи; Формоза, Филиппинскіе и Зондскіе о-ва.

*Rostratula capensis.*