

грациозно и взмахивали при этомъ крыльями или двигались на встречу другъ другу и кружились уже тогда, когда сходились».

Птенецъ приблизительно въ $\frac{3}{4}$ взрослаго (плюсна 210, у φ 240 mm.); вся голова и шея, надхвостье и бока живота покрыты у него пухомъ; на концѣ перьевъ крыла и хвоста пуховые кисточки.

Сем. Rallidae.

221. *Fulica atra* LINN.

Въ дневникѣ П. К. Козлова подъ заголовкомъ *Fuligula fuligula* имѣется замѣтка, что лысуха была встрѣчена вмѣстѣ съ этимъ ныркомъ въ первой половинѣ апрѣля 1900 года на озеркѣ болота Иргицыкъ въ восточномъ Цайдамѣ (9630').

Отрядъ Galliformes.

Сем. Tetraonidae.

222. *Lagopus lagopus* (LINN.).

\varOmega adlt., II/3. VII. 1899, хреб. Тау-тэке, Большой Алтай.
c. 7000'. 3 ♂, \varOmega adlt., 2 ♂ juv., кон. VII. 1899, плато Укокъ, Алтай.
pull. semiflocc., 24. VII. 1899, Кара-булакъ, Укокъ, Алтай.

Полупуховой птенецъ величиною съ перепелку; голова и частью туловище покрыты мѣстами еще пухомъ. Молодые самцы (?) въ $\frac{3}{4}$ старыхъ.

«Впервые была встрѣчена въ хребтѣ Тау-тэке. Вторично мы нашли эту бѣлую куропатку въ верхнемъ и рѣже въ среднемъ поясѣ на Укокѣ, плато Алтая, въ большомъ количествѣ. Самцы держались по одиночкѣ, самки съ выводками. Птенцы были различныхъ возрастовъ — отъ величины меньше перепелки до величины сѣрой куропатки. Держалась по склонамъ и площадямъ, расположеннымъ вблизи воды и покрытымъ низкорослой бересой или тальникомъ. Птенцы то таились, то старались скрыться въ заросли».

223. *Lyrurus tetrix* (LINN.).

c. 4500'. ♂ juv., 20—21. VII. 1899, верховье р. Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

Молодая птица въ $\frac{3}{4}$ взрослой съ отдѣльными черными перьями по бокамъ зоба.