

Опредѣлить типичный ли это *L. tetrrix tetrrix* или *L. tetrrix voridanus* — невозможно.

«Найденъ у перевала Коко-даба на мягкомъ лугу; держались преимущественно у кочекъ, разрытыхъ мелкими грызунами».

#### 224. *Tetrastes bonasia septentrionalis* СЕЕВ.

2410'. ♂ adlt., к. XI. 1901, окр. гор. Кяхты.

2410'. ♂ adlt., 1/3. XII. 1901, окр. гор. Кяхты.

Относится къ типичному *T. septentrionalis*.

Въ дневникѣ П. К. Козлова нѣтъ никакихъ замѣтокъ.

#### 225. *Tetrastes sewertzowi* PRZEW.

7100'. 2 ♂, 4 ♀ adlt., II. 1900, окр. кум. Чортэнтанъ, на р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

13.040'. 3 ♂, 2 ♀ adlt., III/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.

11.960'. ♂ adlt., I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

12.610'. ♂ adlt., 7—9. III. 1901, ущ. рѣч. Сэнъ-чю, прав. прит. Ды-чю или верх. теч. Голубой рѣки.

«Въ февралѣ 1900 г. найденъ въ одномъ изъ ущелій праваго берега р. Тэтунга въ чащѣ хвойнаго и березоваго лѣса. Разъ одиночный рябчикъ былъ встрѣченъ въ стадѣ, образованномъ *Crossoptilon auritum* и *Ithaginis sinensis*.

«Затѣмъ рябчикъ этотъ нигдѣ намъ не попадался до прихода на рѣку Баръ-чю. Здѣсь онъ былъ обыкновенъ въ хвойномъ лѣсу, въ глубинѣ или по опушкѣ у зарослей тальника, особенно такихъ, которыя примыкаютъ къ горному ручью. Онъ поднимается до верхней границы ели на абсолютной высотѣ 13.000 футовъ, гдѣ живетъ и *Tetraophasis széchenyi*. Почують рябчики въ срединѣ тальниковыхъ кустовъ.

«На мѣстѣ зимовки экспедиціи у долины Рэ-чю рябчикъ былъ найденъ въ небольшомъ количествѣ».

Наконецъ встрѣченъ на обратномъ пути экспедиціи въ бассейнѣ Голубой рѣки.

«Мѣстные тангуты называютъ этого рябчика — «сакна».

*Tetrastes sewertzowi* свойственъ всей восточной окраинѣ Тибета, начиная отъ сѣвернаго склона центрального Нань-шаня, гдѣ его нашла экспедиція братьевъ Грумъ-Гржимайло на рѣкѣ Бабо-хэ, до бассейна Меконга; тутъ онъ добытъ въ окрестностяхъ Чамдо не только П. К. Козло-