

часть спины; сѣрый полушейникъ на зашейкѣ очень явственный; надхвостье и верхнія кроющія хвоста довольно чистаго сѣраго цвѣта безъ замѣтной примѣси бураго оттѣнка.

Восточную границу распространения этого подвида, *Caccabis chukar chukar* (I. E. GRAY), не трудно прослѣдить по нашимъ матеріаламъ. Къ нему относятся все 14 птицъ, добытыхъ въ области Тарбагатайскаго хребта (Зайсанскій постъ, Кендерлыкъ, гора Монракъ и Кишкене-тау — предгоріе Саура); въ западной Джунгаріи Пржевальскій наблюдалъ его въ большомъ числѣ въ горахъ Джаиръ и нерѣдко въ Семисъ-тау или Катынъ-ула. Самымъ восточнымъ пунктомъ въ Тянь-шанѣ является южный склонъ хребта Курлыкъ-тау къ сѣверу отъ Хами, гдѣ его наблюдалъ въ незначительномъ числѣ Пржевальскій; начиная отсюда, онъ былъ найденъ на южной же окраинѣ Тяньшаньскаго массива: экспедиціей Пѣвцова въ Аргый-булакъ-тагъ къ югу отъ Урумчи; экспедиціей Роборовскаго на рѣкѣ Алго и въ Кызыль-сынырѣ на сѣверномъ, болѣе влажномъ склонѣ хребта Курукъ-тагъ, составляющаго прямое продолженіе Тянь-шаня, но расположеннаго уже въ Гашуньской Гоби къ юго-востоку отъ западнаго конца озера Баграшъ-куль. На впадающей въ это озеро рѣкѣ Хайду-голь, на ея притокахъ Балгантай и Хабцагай, на Юлдусахъ, на рѣкѣ Кунгесъ, впадающей уже въ Или, и въ крайнихъ хребтахъ Илійской долины его наблюдалъ и собиралъ Пржевальскій; кромѣ того изъ центрального Тянь-шаня имѣются птицы, добытыя Сѣверцовымъ и Алфераки. Интересно, что на всей этой южной окраинѣ Тянь-шаня, направленной къ Таримской котловинѣ, и даже въ Курукъ-тагѣ водится темная *C. chukar chukar* и только въ хребтѣ Кара-теке, расположенномъ къ югу отъ Таушканъ-дарьи и находящемся подъ вліяніемъ сухаго климата Кашгаріи, появляется блѣдная *C. chukar pallescens* — фактъ, аналогичный съ распространениемъ тутъ *Leptopoeile sophiae sophiae* и *L. sophiae stoliczkae*¹⁾. Распространеніе *C. chukar chukar* по всему западному Тянь-шаню до Кара-тау и вообще по Туркестану я подробно разсматривать тутъ не стану; скажу только, что она водится въ Ферганѣ и на Алайскомъ хребтѣ, но не встрѣчается по Сѣверцову²⁾ на Памирахъ. Въ бассейнѣ верхняго теченія Аму-дарьи, къ

1) Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., (5) XXII, 1905, p. 42.

2) Зап. Турк. отд. Общ. Люб. Естествозн., Антроп. и Этногр., I, 1879, p. 87. — Ibis, 1883, p. 80. — Слѣдующая птица, водящаяся въ Туркестанѣ, но отсутствующая на Памирѣ, въ списокѣ Сѣверцова въ Ibis'ѣ помѣчена вслѣдствіе корректураго недосмотра безъ родового названія, вмѣсто котораго подъ родомъ *Caccabis* поставлена черта (такъ что выходитъ — *hyemalis*); OGDEN GRANT прочелъ *Caccabis hyemalis* и помѣстилъ это названіе въ число синонимовъ *C. chukar* (Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 114). Въ дѣйствительности подъ чертой нужно подразумѣвать *Gallinago* и читать *Gallinago hyemalis*.