

югу отъ Заалайскаго хребта живетъ уже блѣдная форма, къ которой я перейду ниже.

Въ сѣверной Джунгаріи, на рѣкѣ Урунгу, и въ восточной, на своемъ пути отъ этой рѣки на Баркуль, Пржевальскій не встрѣчалъ *C. chukar* въ апрѣлѣ и маѣ 1879 года, но по сѣверную сторону Чернаго Иртыша, раздѣляющаго горныя системы Тарбагатай и Алтай она снова появляется въ нѣсколько отличной формѣ, которую я не рѣшаюсь еще окончательно присоединить къ *C. chukar chukar*. Это тоже темная, интенсивно окрашенная форма, характеризующаяся: болѣе темнымъ оттѣнкомъ винно-краснаго цвѣта межлопаточной области, откуда онъ распространяется и на нижнюю спину; менѣе явственно развитымъ сѣрымъ полушейникомъ на зашейкѣ и сѣровато-бурымъ цвѣтомъ надхвостья и верхнихъ кроющихъ хвоста. Типичныя особи этой формы отличаются отъ *C. chukar chukar* довольно легко, но попадаются и такія, которыхъ не знаешь куда отнести, т. е. повторяется то, на что мы натыкаемся въ каждомъ или большинствѣ подвиговъ; такъ, у нѣкоторыхъ экземпляровъ изъ восточной части области распространенія формы сѣрый полушейникъ выраженъ иногда очень недурно. Форма эта уже извѣстна въ литературѣ; ее отмѣтилъ SWINHOE въ 1871 году по экземплярамъ изъ сѣвернаго Китая и назвалъ *C. chukar var pubescens*: «Chinese specimens have a deep blush of rosiness over their upper plumage, which is not seen in Himalayan skins». Область распространенія этого подвида, *C. chukar pubescens* SWINHOE¹⁾, я прослѣжу съ запада. Самое западное изъ извѣстныхъ мнѣ мѣстонахожденій приходится на Большой Алтай, гдѣ его добыла экспедиція Г. Н. Потанина на рѣкѣ Кандагатай или Хандагатай, одной изъ вершинъ Крана, притока Чернаго Иртыша. Затѣмъ та же

1) Синонимика и литература этой формы слѣдующая:

Perdix graeca (non STERN.) EVERSMAAN, Journ. Orn., 1853, p. 292.

Perdix altaica BONAPARTE, Compt. Rend., XLII, 1856, p. 882 (sine descr.); GRAY, List Gallinae Brit. Mus., p. 80 (1867); Hand-list B., II, p. 274 (1870).

Caccabis chukar (non I. E. GRAY) SWINHOE, Ibis, 1865, pp. 353, 542; 1867, p. 402; Proceed. Zool. Soc. London, 1870, pp. 439, 447; Ibis, 1875, p. 126; HEUGLIN, Jour. Orn., 1874, p. 399; PRZEWALSKY, Монг. и стр. Танг., II, Птицы, p. 126 (1876); in ROWLEYS, Orn. Misc., II, pp. 425, 426 (1877); DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 395 (1877); OGILVIE GRANT, Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 113 (part.; 1893); STYAN, Ibis, 1894, p. 335; SCHALOW, Journ. Orn., 1901, pp. 416—417 (partim: specim. f ex Nanschan); WALTON, Ibis, 1903, p. 32.

Perdix chuchar (non I. E. GRAY) DAVID, Nouv. Arch. Mus. Paris, VII, 1871, Bull. p. 11.

Caccabis chukar var. pubescens SWINHOE, Proc. Zool. Soc. London, 1871, p. 400.

Perdix chukar (non I. E. GRAY) Березовскій въ Потанинъ, Оч. сѣв.-зап. Монг., I, p. 346 (1881).

Caccabis saxatilis chukar (non I. E. GRAY) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 13 (1891).