

экспедиція собирала его на рѣкѣ Теректы, сѣверномъ притокѣ Буянту, на этой послѣдней рѣкѣ и въ окрестностяхъ расположеннаго на ней города Кобдо. М. М. Березовскій¹⁾ говоритъ: «Начиная отъ Зайсанскаго поста» (это несомнѣнно еще *C. chukar chukar*) «встрѣчалась во многихъ мѣстахъ, въ особенности же много около г. Кобдо; въ Улясутаѣ (въ хребтѣ Хангай) кажется довольно рѣдка. Держится зимой и лѣтомъ всегда въ скалистыхъ горахъ. Самыхъ сѣверныхъ мы нашли на рѣкѣ Кобдо, недалеко отъ ставки Хуре-Дурбетскаго хана». У меня нѣтъ никакихъ данныхъ о неподлежащемъ впрочемъ сомнѣнію находеніи *C. chukar pubescens* въ западной части Гобійскаго Алтая, но на восточной его оконечности, въ хребтѣ Хурку въ центральной части восточной Гоби, ее нашель Н. М. Пржевальскій во время своего третьяго путешествія и въ средней же Гоби добылъ ее въ послѣднее путешествіе П. К. Козловъ. Пржевальскій²⁾ говоритъ, что хребетъ Хурку составляетъ самый сѣверный пунктъ распространенія ея въ восточной Монголіи. Южнѣе онъ находилъ ее въ хребтахъ Муни-ула, Хараноринъ-ула и Алашаньскомъ, а также въ небольшихъ горныхъ группахъ среди песковъ Ала-шаня, напр. въ Шангынъ-далайской. Наконецъ онъ же увѣряетъ, что она встрѣчается въ крайнемъ къ сторонѣ Ала-шаня хребтѣ восточнаго Нань-шаня (Гань-су). Въ маршрутѣ П. К. Козлова тоже есть указаніе, что онъ встрѣтилъ *Caccabis* 24. I. 1900 у селенія Хэй-тунъ-и, къ югу отъ города Гу-ланъ-сяня въ крайнемъ хребтѣ Нань-шаня. Во всякомъ случаѣ шкурокъ отсюда ни у Пржевальскаго, ни у П. К. Козлова нѣтъ. Далѣе внутрь Нань-шаня и къ западу по его окраинѣ *C. chukar pubescens* не проникаетъ, но къ востоку ее добыла экспедиція Потанина 1884—87 гг. на рѣкѣ Уланъ-мурень въ Ордосѣ. Въ Гань-су она должна быть очень рѣдка: М. М. Березовскій³⁾ встрѣтилъ ее лишь въ одномъ мѣстѣ, на береговыхъ скалахъ рѣки, на которой стоитъ городъ Сигу, близъ города и ниже, вверхъ же по рѣкѣ и въ другихъ частяхъ Сигученскаго округа, а также въ Хойсяньскомъ округѣ ея повидимому нигдѣ нѣтъ. Точно также М. М. Березовскій не привезъ ее и изъ послѣдняго своего путешествія въ Сы-чуань, хотя DAVID⁴⁾ и замѣчаетъ глухо, что она найдена имъ отъ Пекина до Сы-чуани, а SWINHOE⁵⁾ тоже говоритъ, что она встрѣчается во всемъ сѣверномъ Китаѣ къ югу до сѣвернаго берега верхняго теченія Голубой рѣки. Съ другой стороны STUAN⁶⁾ считаетъ птицу, до-

1) Потанинъ, Очерк. сѣв.-зап. Монг., I, p. 346.

2) Монг. и стр. Танг., II, Птицы, стр. 136.

3) BEREZOWSKI et BLANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 13.

4) Nouv. Arch. Mus. Paris, VII, 1871, Bull., p. 11.

5) Proc. Zool. Soc. London, 1871, p. 400.

6) Ibis, 1894, p. 335.