

infer, but is distinguished by an appreciably different coloration..... The Chikore of Eastern Turkestan (*C. pallidus* of HUME), however, is only slightly paler and more sandy-coloured than *C. chukar* from the southern slopes of the Himalayas, and should not be separated from the latter». Я считаю всѣхъ этихъ блѣдно окрашенныхъ птицъ за одинъ подвида, который называю *Caccabis chukar pallescens* HUME¹⁾ потому, что названіе pallida было уже дано одной изъ разновидностей *Caccabis rufa* въ 1833 г. NAUMANN'омъ. *C. chukar pallescens* отличается отъ блѣдной формы юго-западной Азии, *C. chukar sinaica* BONAP., менѣе явственнымъ полушейникомъ на затылкѣ, сѣрый цвѣтъ котораго съ примѣсью буроватаго, а кромѣ того вообще меньшей чистотой всѣхъ цвѣтовъ окраски. Я не знаю, можно ли вводить въ діагнозъ этой формы болѣе крупную ея величину: величина всѣхъ *Caccabis* варьируетъ въ весьма значительныхъ предѣлахъ и даже среди очень крупной *C. magna* попадаются мелкія особи. У 8 взрослыхъ самцовъ *C. pallescens* крыло колеблется между 171.5 и 151.0 mm., а у столькихъ же самокъ отъ 161.5 до 150.0. — Центромъ области распространенія *C. pallescens* является сѣверо-западный уголъ Тибета отъ долины верхняго Инда въ Ладакѣ на югѣ до западныхъ отроговъ Куэнь-луня на сѣверѣ. Къ западу отсюда она проникаетъ по Гильгиту на верховья Аму-Дарьи, гдѣ въ Вакханѣ ее наблюдалъ между Sarhad'омъ и Ranjah BIDDULPH²⁾, и затѣмъ далѣе внизъ по системѣ той же рѣки до Кабадіана, такъ какъ пару птицъ, добытыхъ 5. V. 1885 г. Грумъ-Гржимайло въ хребтѣ Баба-тагъ, раздѣляющемъ рѣки Кафирниганъ и Сурханъ, сѣверные притоки Аму-Дарьи, я считаю относящимися къ этому блѣдному подвиду. Къ сѣверу отъ западной окраины Куэнь-луня она должна встрѣчаться во всѣхъ восточныхъ отрогахъ Памирскаго массива, такъ какъ по SCULLY она очень обыкновенна во всѣхъ, горахъ, окаймляющихъ Кашгарію съ юга, запада и сѣвера, гдѣ живетъ на высотѣ 6.000—12.500 футовъ. Дѣйствительно, птицы, добытыя экспедиціей Пѣвцова въ бассейнѣ Таушканъ-дарьи, прорѣзывающей южную окраину центральнаго Тянь-шаня, именно въ отрогѣ послѣдняго, хребтѣ

1) Синонимика и литература этого подвида слѣдующая:

Caccabis chukar (non I. E. GRAY) ADAMS, Proc. Zool. Soc. Lond., 1859, p. 185 (part., ex Ladak); BIANCHI, Mel. Biolog. Acad. Sc. St.-Petersb., XII, 1886, p. 678; SHARPE, Sec. Yark. Miss., Birds, p. 121 (1891); BIDDULPH, Str. Feath., IX, 1880, p. 358; Ibis, 1881, p. 93; SCULLY, Ibis, 1881, p. 586; Str. Feath., X, 1881, p. 139; SCHALOW, Journ. Orn., 1901, p. 416—417 (part., specim. *d, e* ex Kaschgar).

Caccabis pallescens HUME in HENDERSON and HUME, Lahore to Yarkand, p. 283 (1873); SCULLY, Str. Feath., IV, 1876, p. 182.

Caccabis pallidus HUME, l. c., p. 284 (1873); FORSYTH, Proc. Zool. Soc. Lond., 1874, p. 324; SCULLY, Str. Feath., IV, 1876, p. 183; SHARPE, Sec. Yark. Miss., Birds, p. 121 (1891).

2) SHARPE, Scient. Res. Second. Yarkand Miss., Birds, p. 122.