

полуострова, Сиріи и Палестины вѣроятно по Аравіи, но врядь ли по Месопотаміи, черезъ южную Персію до Белуджистана, а можетъ быть и до Синда. Мелкій блѣдный экземпляръ (крыло  $5.75'' = 146$  mm.), описанный ХУМЕ'омъ подъ именемъ *C. arenarius* по птицѣ будто бы изъ Адена, для котораго БАРНЕС считаетъ *C. chukar* вообще сомнительной, и мелкій экземпляръ (крыло 145 mm.) изъ Kalagán'a въ Белуджистанѣ, упоминаемый БЛАНФОРД'омъ, относятся по всей вѣроятности къ этому подвиду. За отсутствіемъ матеріала я не могу сказать больше объ этой формѣ.

Такимъ образомъ нагорной центральной Азіи свойственны три подвида *C. chukar*, именно: *C. chukar chukar*, распространенный въ системѣ Тяньшаня и Тарбагатая, *C. chukar pubescens*, живущій въ системѣ южнаго Алтая и въ горныхъ странахъ средняго и нижняго теченія Желтой рѣки вплоть до Печилійскаго залива и наконецъ *C. chukar pallescens*, водящійся въ западныхъ, южныхъ и восточныхъ отрогахъ Памирскаго массива и въ сѣверо-западномъ углу Тибета, по сѣверной окраинѣ котораго онъ распространяется до западной оконечности хребта Гумбольдта. Сѣверо-восточному Тибету свойственъ, какъ упоминалось выше, уже вполне самостоятельный видъ —

*Caccabis magna* PRZEW. Область распространенія его разъединяетъ области *C. chukar pallescens* и *C. chukar pubescens* въ предѣлахъ большей части Нань-шаня, гдѣ распространеніе первой на востокъ оканчивается на западной оконечности хребта Гумбольдта (р. Дань-хэ), а распространеніе второй на западъ въ окраинѣ, прилегающей къ пескамъ Тенгери. *C. magna* водится во всѣхъ горахъ, окаймляющихъ Цайдамъ съ юго-запада, юго-востока и сѣверо-востока. Самыя западныя ея мѣстонахожденія приходятся на южную окраину хребта Цайдамскаго и на сѣверную хребта Колумба, гдѣ ее наблюдалъ Пржевальскій въ ноябрѣ 1884 г.; въ хребтѣ Чамень-тагъ она уже не встрѣчается. Начиная отъ этихъ двухъ хребтовъ, она должна распространяться по сѣверной окраинѣ Тибетскаго нагорья въ узкомъ смыслѣ слова, гдѣ ее добылъ Пржевальскій въ ущельи рѣки Найд-

*Chacura graeca sinaitica* HEUGLIN, Peterm. Geogr. Mitth., 1869, p. 417.

*Caccabis sinaica* HEUGLIN, Orn. N.-O. Afr., III, p. 916 (1873); Давыдовъ, Труд. Спб. Общ. Естеств., XXIX, 1898, i, p. 222.

*Caccabis chukar* BLANFORD, East. Persia, II, p. 275 (1876, part., ex Kalagán); Faun. Brit. Ind., Birds, IV, p. 131 (1898, part., ex Sind?); BARNES, Ibis, 1893, pp. 166, 181; 1896, pp. 31, 41; SHARPE, Ibis, 1886, p. 498; Давыдовъ, Труд. Спб. Общ., Естеств., XXIX, i, p. 222.

*Caccabis sinaitica* KAISER, Orn. 1890, p. 521.

*Caccabis arenarius* HUME in HENDERSON et HUME, Lahore to Yarkand, pp. 283, 284 (1873).

*Caccabis chukar* var. *margaritae* DAWYDOFF, Trud. St.-Petersb. Obstsch. Estestwoisp., XXIX, 1898, i, pp. 57—63, ii, p. 222.