

жинь-голь, раздѣляющей хребты Торай и Толай, Пржевальскій же и Козловъ въ хребтѣ Бурханъ-Будда; къ югу отъ этого хребта, на плато Тибета, она по Пржевальскому уже не поднимается. Въ горахъ, прилегающихъ къ Цайдаму съ юго-востока ее добылъ Пржевальскій и въ первое, и въ четвертое свои путешествія. Съ Южно-Кукунорскаго хребта ее доставили экспедиціи Пржевальскаго, Роборовскаго и Козлова, съ верховьевъ Желтой рѣки къ югу отъ озера Куку-норъ — Пржевальскій въ 1880 году. Данныхъ о распредѣленіи ея по Нань-шаню между меридіанами Куку-нора и Са-чжоу нѣтъ, если не считать указанія въ таблицѣ, приложенной къ описанію путешествія Роборовскаго 1893—95; тѣмъ не менѣе она должна тутъ встрѣчаться, потому что ее нашли съ одной стороны Пржевальскій въ 1879 г. въ горахъ сѣвернаго Цайдама вообще и на рѣкѣ Орогынъ-голь на южномъ склонѣ хребта, ограничивающаго равнину Сыртынъ съ юга, а съ другой стороны докторъ Пясецкій въ Юй-мынь-сянѣ на западной оконечности хребта Рихтгофена, самаго сѣвернаго изъ наньшаньскихъ хребтовъ.

Обзоръ центрально-азиатскихъ формъ рода *Cassabis* заключу синоптической таблицей:

- 1 (4) Отъ черной перевязи, закрывающей переднюю часть лба и идущей отъ глаза къ глазу, черный цвѣтъ распространяется съ одной стороны внизъ на уздечку, гдѣ примыкаетъ къ ноздревому клапану, а съ другой стороны идетъ въ видѣ широкой полоски по всей верхней окружности глаза, переходя затѣмъ непрерывно въ черную полосу, тянущуюся по основной части ушной области и бокамъ шеи до зоба, гдѣ замыкается съ такой же полосой противоположной стороны въ поясокъ.
- 2 (3) Вся уздечка отъ ноздревыхъ клапановъ до передней части нижней окружности глаза черная; развѣ самыя переднія изъ перышекъ, покрывающихъ вѣтви нижней челюсти у зѣвковъ, черноватая; только самыя переднія изъ перышекъ, покрывающихъ подбородокъ между челюстями нижней челюсти, черноватая. Большая часть ушныхъ коричневая. Отъ ушныхъ по бокамъ шеи, прилегая снаружи къ черной полосѣ, тянется коричневая полоса, тоже опоясывающая зобъ. На серединѣ зоба и черная, и коричневая полоски, образующія поясокъ, становятся неясными. **C. magna.**
- 3 (2) Лишь передняя, прилегающая къ ноздревому клапану часть уздечки черная, большая же задняя, примыкающая къ глазу бѣловатая; перышки, покрывающія вѣтви нижней челюсти у зѣвковъ, образуютъ довольно большое черное пятно; на подбородкѣ большое интенсивно-черное пятно. Ушные черныя, лишь самыя кончики ихъ слегка рыжеваты. Кнаружи отъ черной полосы, опоясывающей горло и зобъ, нѣтъ коричневой полосы. На серединѣ зоба поясъ изъ черныхъ перьевъ очень рѣзкій. **C. saxatilis.**
- 4 (1) Черная перевязь, идущая по передней части лба отъ глаза къ глазу, не даетъ продолженія ни на уздечку, ни по верхней окружности глаза; вслѣдствіе этого вся уздечка отъ ноздревыхъ клапановъ до нижней части окружности глаза бѣловатая или соловая, а между лобной полоской и черной полоской, начинающейся отъ задняго угла глаза, образуется на верхней части окружности глаза перерывъ. — Ушные коричневые, если не считать основную ихъ часть, входящую