

233. *Perdix sifanica* PRZEW.

- с. 13.000'. ♀ adlt., pull. semifoss., 19. VII. 1900, рѣч. Хи-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
- с. 13.000'. ♂ adlt., III/3. VIII. 1900, дол. рѣч. Дза-чю, прит. Цзанъ-да, сист. Ды-чю.
12.090'. pull., 9—20. VIII. 1900, сел. Чжэрку на лѣв. бер. рѣч. Цзанъ-да, прит. Ды-чю.
- с. 12.000'. 2 ♂ juv., I/3. IX. 1900, р. Дза-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
- с. 11.000'. 2 ♂, 2 ♀ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.
- 12.020'. 2 ♂ adlt., I/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на лѣв. бер. рѣч. Сэръ-чю, впад. въ Дза-чю, лѣв. прит. Голубой рѣки.

Птенецъ, добытый съ самкой 19. VII на р. Хи-чю, очень малъ и весь еще въ пуху за исключеніемъ крыльевъ, которыя въ перьяхъ. Птенецъ, собранный 9—20. VIII въ сел. Чжэрку, вдвое больше перваго, почти съ перепелку и весь въ перьяхъ, за исключеніемъ большей части головы и боковъ живота, гдѣ онъ покрытъ пухомъ. Изъ взрослыхъ птицъ удлиненныя перья на горлѣ развиты болѣе или менѣе только у ноябрьскихъ и въ меньшей степени у апрѣльскихъ и притомъ помѣченныхъ какъ самцами, такъ и самками. У самки, добытой 19. VII, и самца, добытаго въ концѣ августа, нѣтъ и слѣда ихъ. Я не знаю, вѣрно ли помѣченъ полъ, но вѣроятнѣе всего, что удлиненныя, съ черными стержнями и кончиками перья относятся къ сезоннымъ признакамъ обоихъ половъ и лѣтомъ исчезаютъ. У *P. hodgsoniae* изъ Сиккима, находящейся въ свѣжемъ зимнемъ перѣ, я тоже нахожу ихъ. Поэтому они не могутъ представлять дифференціального признака *P. sifanica* въ отличіе отъ *P. hodgsoniae*, какъ указываемъ мы съ М. М. Березовскимъ¹⁾. Величина черного пятна на бокахъ шеи на уровнѣ задняго края глаза варьируетъ у многихъ экземпляровъ *P. sifanica* ничуть не меньше, чѣмъ у *P. hodgsoniae*; поэтому это тоже не дифференціальный признакъ²⁾ двухъ видовъ, которые различаются такимъ образомъ только окраской середины груди (тогдашъ кзади отъ зоба): у *P. hodgsoniae* тутъ сплошное черное пятно, въ зимнемъ перѣ болѣе или менѣе скрытое свѣтлыми кончиками перьевъ, а у *P. sifanica* его нѣтъ.

«На Хи-чю 19 іюля сифанская куропатка имѣла мелкихъ птенцовъ. Ладыгину удалось поймать во время сборовъ растений и бабочекъ сачкомъ для послѣднихъ птенца, а затѣмъ и прибѣжавшую на его жалобный крикъ самку; самецъ держался въ отдаленіи. Въ бассейнѣ Голубой рѣки видъ этотъ довольно обыкновененъ съ 12,500 футовъ абсолютной высоты. Въ

1) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 13 (1891).

2) OGILVIE GRANT, Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 185, 195.