

бассейнѣ Меконга онъ тоже обыкновененъ, особенно въ долинахъ рѣкъ, гдѣ держится на пашняхъ. По утрамъ, лишь солнце освѣтитъ береговья террасы, куропатки начинаютъ издавать свои скрипучіе звуки».

«Тангутское названіе птицы — «*сакпа*»¹⁾).

P. sifanica свойственна исключительно восточной окраинѣ Тибета, гдѣ она распространена отъ крайняго сѣвернаго хребта Нань-шаня къ югу до самаго верхняго теченія Салуэна. Открытая впервые въ іюлѣ 1872 года Пржевальскимъ въ бассейнѣ рѣки Тэтунгъ-голь въ центральной части восточнаго Нань-шаня, она была найдена впоследствии братьями Грумъ-Гржимайло и на сѣверной окраинѣ его (Матиссе, Пьянь-до-го). Начиная отсюда она живетъ на всемъ протяженіи Нань-шаня отъ Сицина (Мынь-дань-ша, Чань-хо; сборы Грумъ-Гржимайло) на востокъ до хребта Риттера (Пржевальскій, іюль 1879) на западѣ. Въ Южно-Куку-норскомъ хребтѣ ее собирали какъ Пржевальскій (февраль 1880; апрѣль 1884), такъ и экспедиція Роборовскаго. Въ верховьяхъ Желтой рѣки ее нашла экспедиція Роборовскаго на южномъ склонѣ хребта Амнэ-мачинъ, а нѣсколько къ востоку отсюда добылъ ее М. М. Березовскій²⁾ въ горахъ праваго берега Тао-хэ, въ округѣ города Ди-дао уже въ провинціи Гань-су (Амдосское нагорье). Въ системѣ Голубой рѣки далѣе всего на западъ *P. sifanica* добыта Н. М. Пржевальскимъ въ іюнѣ 1884 г., при впадении рѣчки Конъ-чюнъ-чю; далѣе идутъ мѣстонахожденія послѣдней экспедиціи П. К. Козлова, который собиралъ ее тутъ въ передній путь въ трехъ мѣстахъ, а на возвратномъ пути въ селеніи Бана-джунъ; въ предѣлахъ Сычуани добыли ее М. М. Березовскій въ Сюе-шанѣ близъ Сунъ-пана въ апрѣлѣ 1894, затѣмъ STUAN³⁾ въ Сунъ-панѣ же въ октябрѣ и въ Дунъ-бэй (Tung-rei) въ ноябрѣ, наконецъ DAVIES⁴⁾ на западной границѣ этой провинціи въ Dzungun'ф (29° 15' с. ш., 99° 15' в. д. Гринв.) на одномъ изъ притоковъ Голубой рѣки, гдѣ послѣдняя подходитъ ближе всего къ Меконгу; въ предѣлахъ южной Гань-су ее нашелъ М. М. Березовскій⁵⁾ противъ дер. Тахэй-гоу, на перевалѣ, отдѣляющемъ здѣсь Гань-су отъ Сычуани. Въ системѣ Меконга *P. sifanica* доказана теперь для окрестностей Чамдо П. К. Козловымъ. Къ системѣ Салуэна относятся мѣстонахожденія экспедиціи принца Г. Орлеанскаго и Бонвало, именно Tioungou (17. IV.

1) П. К. Козловъ пишетъ «*сокпа*», что врядъ ли правильно. Тибетцы называютъ *P. hodgsoniae* «*sakpha*». Не подлежитъ сомнѣнію, что тибетцы, называвшіе П. К. Козлову тѣмъ же именемъ *Tetrastes sewertzowi*, смѣшивали рябчика съ куропаткой.

2) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 13.

3) Ibis, 1899, p. 298.

4) Ibis, 1901, p. 410.

5) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, p. 13.