

1890) и Thounyo (30. IV. 1890) — оба между So (гдѣ экспедиція была 15. IV) и Rutchi (5. V). Въ остальныхъ мѣстахъ западнаго Китая, даже въ Да-дзянь-лу и Мупинѣ, видъ этотъ пока не найденъ и вѣроятно вовсе не встрѣчается.

P. hadgsoniae ограничена исключительно юго-западной частью Тибетскаго нагорья. Тутъ она была найдена на плато (Tsang) къ сѣверу отъ Сиккима и Непала и даже въ центральной части Сиккима, но она не спускается до Darjeeling'a. Къ западу она прослѣжена до Hanlee въ верховьяхъ Инда, Oong Lung La Pass между долиной верхняго Инда и озеромъ Rangong и даже до Nobra къ сѣверу отъ Ладака, хотя BLANFORD ¹⁾ говоритъ, что до Ладака она не доходитъ. Изъ юго-западнаго Гималая она извѣстна съ рѣки Bhagirathi, притока Ганга въ Кумаонѣ, и изъ сѣверныхъ окрестностей Mussooree между рр. Багирати и Джумна къ сѣверу отъ Сиваликскихъ холмовъ и къ юго-востоку отъ Симлы. Этотъ видъ живетъ на высотѣ 14.—18.000 футовъ.

234. *Coturnix coturnix* (LINN.).

с. 4000'. ♀ adlt., II/2. VII. 1899, долина Бухтармы, прит. Иртыша, Алтай.

«Въ долину Бухтармы перепелки клали еще яйца 15 іюля».

235. *Ithaginis sinensis sinensis* (DAVID).

7100'. 3 ♂ adlt., I. 1900, окр. кум. Чортэтанъ, р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

7100'. 6 ♂, 5 ♀ adlt., II. 1900, окр. кум. Чортэтанъ, Нань-шань.

По отмѣткѣ П. К. Козлова радужина красновато-желтая или бѣло-желтоватая, клювъ темный, ноги красныя.

Я имѣлъ уже случай выяснить ²⁾, что всѣ птицы, добытыя экспедиціей, относятся къ типичной, установленной DAVID'омъ, формѣ. Самцы этой формы отличаются отъ самцовъ *I. sinensis berezowskii* БІАНКИ 1903 тѣмъ, что рыжій цвѣтъ на крылѣ никогда не достигаетъ у нихъ интенсивности коричневаго и въ немъ замѣчается примѣсь зеленаго пигмента, тогда какъ у *I. berezowskii* имѣется большою частью примѣсь карминно-краснаго; отъ *I. sinensis michaëlis* типичная форма отличается отсутствіемъ зеленаго пигмента на бѣлыхъ наствольныхъ полоскахъ лопаточныхъ и спины: онъ развитъ иногда вполне явственно только на верхнихъ кроющихъ хвоста, откуда онъ распространяется изрѣдка въ видѣ слѣдовъ не далѣе, какъ до зад-

1) Faun. Brit. Ind., Birds, IV, p. 143.

2) Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, VIII, 1903, стр. 1—10. — Journ. Orn., 1904, pp. 70—80.