

черамъ, на зоряхъ, птицы спускаются къ нижней опушкѣ лѣса и на дно ущелій, гдѣ кормятся въ разсыпную, очень часто скликаясь своими металлически-звонкими голосами. Ночуютъ птицы то на землѣ, то на деревьяхъ, внизу ущелій, днемъ же поднимаются въ верхній поясъ горъ. При преслѣдованіи онѣ часто убѣгаютъ пѣшкомъ, иногда же садятся на деревья. На глаза попадаются очень рѣдко, развѣ на дорожкахъ. Въ общемъ онѣ доврчивы, но послѣ выстрѣла становятся нѣсколько осторожнѣе».

### 236. *Ithaginis geoffroyi* VERR.

- 13.040'. ♂, ♀ adlt., 3 ♂, 1 ♀ jun., III/8. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю (Меконга).  
 13.040'. 6 ♂, 1 ♀ adlt., 1 ♂ jun., I/3. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю.  
 11.430'. ♂, ♀ adlt., 27—29. X. 1900, р. Ному-чю, прит. Дза-чю (Меконга).  
 с. 11.000'. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) къ сѣв. отъ г. Чамдо.  
 11.960'. ♂, ♀ adlt., XI. 1900, рѣч. Ронъ-чю при слияніи съ Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.  
 11.960'. 3 ♂, 2 ♀ adlt., I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

По отмѣткѣ П. К. Козлова радужина у самца темно-бурая, окаймленная желтымъ кольцомъ, у самки изжелта-бурая; клювъ темный, носовые клапаны красные; ноги красныя.

У самцовъ, помѣченныхъ мною «jun.», шпоры еще вовсе не развиты; у другихъ, очевидно болѣе молодыхъ, онѣ являются, по одной на каждой ногѣ, въ видѣ бугровъ съ закругленной вершиной; наконецъ бугры получаютъ видъ острой шпоры, причемъ на каждой или одной изъ ногъ развивается еще вторая. Красный цвѣтъ на бокахъ перьевъ зоба варьируетъ индивидуально, совершенно иногда отсутствуя даже у старыхъ самцовъ, имѣющихъ по двѣ шпоры на каждой ногѣ, и появляясь съ другой стороны у молодыхъ, вовсе не имѣющихъ шпоръ. Красный цвѣтъ на краяхъ рулей развитъ болѣе или менѣе сильно у всѣхъ самцовъ. На рисункѣ у DAVID et OUSTALET<sup>1)</sup> онъ тоже изображенъ, такъ что мнѣ не понятно заявленіе OGILVIE GWANT'a<sup>2)</sup>, что у экземпляра Британскаго музея (изъ Мупина же) «the tail-feathers uniform whitish grey».

Старыя птицы, добытыя въ концѣ сентября, уже въ свѣжемъ нарядѣ; только у самца нѣкоторыя перья на горлѣ имѣютъ еще у основанія остатки чехлика. Октябрьскія птицы безъ всякихъ признаковъ линянія. Молодыя сентябрьскія птицы тоже заканчиваютъ линьку, но на горлѣ перья у нихъ частью еще не смѣнены, частью же отрастаютъ, въ длинныхъ чех-

1) Ois. Chine, pl. 113.

2) Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 270.