

237. *Crossoptilon drouyni* M.-EDW.

- с. 13.000'. ♂, ♀ adlt., 29. VIII. 1900, ур. Рамъ-да, р. Чокъ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. Меконга.  
 с. 12.000'. ♂ pull., 31. VIII. 1900, р. Дзэ-чю, прит. Дза-чю (Меконга).  
 13.040'. ♂ adlt., pull., II/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.  
 13.040'. 3 ♂ adlt., 15. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю.  
 с. 15.000'. ♂, ♀ adlt., 2—3. XI. 1900, рѣч. Шо-па, прав. прит. Дза-чю (Меконга) къ сѣв. отъ г. Чамдо.  
 11.960'. 2 ♂ adlt., I. 1901, рѣка Рэ-чю, лѣв. прит. Дза-чю (Меконга).  
 12.960'. ♀ adlt., 26—27. III. 1901, кум. Янъ-дзэ-гомба на прав. бер. рѣч. Мани-гэнгу, верхов. И-чю, впад. въ Дза-чю, сист. Голубой рѣки.  
 12.020'. ♂ adlt., I/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на лѣв. бер. рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

По отмѣткѣ П. К. Козлова радужина бѣлая; клювъ красноватый или красновато-бѣлый; ноги красныя, когти или желтовато-красные, или черные.

Птенецъ, добытый 31 августа приблизительно въ  $\frac{1}{3}$  взрослой птицы, но тѣмъ не менѣе преобладающій цвѣтъ его уже бѣловато-серый, а на горлѣ, передней сторонѣ шеи и серединѣ низа тѣла почти чисто-бѣлый. Перьевъ первого наряда осталось у него уже не особенно много, но тѣмъ не менѣе по нимъ можно до нѣкоторой степени судить о болѣе раннемъ первомъ нарядѣ и даже утверждать, что птенцы этого вида легко отличаются въ немъ отъ соответственныхъ птенцовъ *Cr. auritum* и его ближайшихъ родственниковъ. Серовато-бурыя перья межлопаточной области у него тоже въ неявственныхъ соловыхъ перевязяхъ, но лопаточные и кроющія крыла помимо этихъ перевязей и V-образныхъ отмѣтинъ имѣютъ еще хорошо развитыя рыжеватыя настволья въ конечной части пера, гдѣ у *Cr. auritum* мы видимъ только соловое вершинное пятно; на нижней сторонѣ тѣла перья предыдущаго наряда сохранились только на бокахъ зоба и отдельныя на бокахъ груди; на нихъ поперечныхъ свѣтлыхъ полосокъ совсѣмъ не замѣтно, но тѣмъ сильнѣе развиты конечныя соловыя настволья, которыя на перьяхъ боковъ груди имѣютъ очень неправильное очертаніе и въ проксимальной своей части нѣсколько напоминаютъ очертаніе карточныхъ червей; первый махъ у него бѣлый, нѣсколько сѣрѣе на внутреннемъ опахалѣ; слѣдующіе два на наружномъ опахалѣ бѣлые, на внутреннемъ черновато-бурые, второй съ неопределенной бѣловатой пестриной; четвертый и слѣдующіе на обоихъ опахалахъ бурые; махи второго разряда бурые въ болѣе грубой, чѣмъ у *Cr. auritum*, соловой пестринѣ, сосредоточеной кромѣ того преимущественно на наружномъ опахалѣ и только на самомъ концѣ внутренняго; на болѣе новыхъ, но еще испещренныхъ, махахъ уже сильно развитъ сѣдой оттѣнокъ или, вѣрнѣе, грубая, неопределенная пе-