

стрина этого оттънка; на махахъ третьяго разряда сѣровато-бѣлый цвѣтъ значительно преобладаетъ; судя по двумъ самымъ среднимъ и четыремъ изъ боковыхъ паръ, всѣ рули бывають сначала однообразной формы и окраски: бурые на большей части своего протяженія, но сѣроватые у самага основанія и на значительной части внутренняго опахала, тогда какъ наружное сѣровато лишь по самому краю и на концѣ; рули слѣдующей смѣны черные съ бѣлымъ или меньшимъ синимъ отливомъ; три самыхъ крайнихъ пары только-что смѣняются и основаніе ихъ окружено чехломъ, такъ что нѣтъ возможности сказать, есть ли на нихъ бѣлый цвѣтъ; какимъ былъ верхъ головы раньше судить нельзя, теперь же онъ буровато-чернаго цвѣта, нѣсколько неровнаго вслѣдствіе того, что всюду просвѣчиваются бурья основныя части перьевъ; бѣлыя изъ ушныхъ перьевъ еще не отрасли.

Птенецъ, добытый во второй трети сентября на р. Баръ-чю, приблизительно въ половину взрослой птицы и уже почти весь бѣлый за исключеніемъ: верха головы, бурья перья котораго начали замѣняться интенсивно черными, нѣсколько курчавыми; буроватыхъ концовъ на перьяхъ межлопаточной области и середины спины, гдѣ образуется ими темная перевязь; большихъ кроющихъ крыла, бѣлая часть которыхъ представляетъ остатокъ пестраго наряда; первыхъ маховъ перваго разряда и двухъ паръ изъ внутреннихъ маховъ второго разряда, окрашенныхъ какъ у болѣе молодого птенца; наконецъ хвоста, въ которомъ уже не осталось перьевъ пестраго наряда; на среднихъ парахъ основаніе пера сѣрое на обоихъ опахалахъ, на крайнихъ же сѣрый цвѣтъ распространяется на наружномъ опахалѣ къ вершинѣ пера; средніе рули удлиннены, но еще почти безъ металлическаго блеска и еще не завиты; ушныя всѣ бѣлыя и удлиннены, но не сильно; клювъ роговаго цвѣта, кромѣ нижней челюсти, которая красновато-желтая; ноги блѣдно-красныя.

У 12 взрослыхъ птицъ цвѣтъ спины варьируетъ отъ сѣровато-бѣлаго до чисто-бѣлаго; середина брюха, иногда и нижней части груди, грязноватая, вѣроятно отъ загрязненія; горло и передъ шеи съ большей или меньшей примѣсью рыжеватаго оттънка, вѣроятно тоже отъ загрязненія, такъ какъ у свѣже вылинявшихъ птицъ рыжина слаба, у ноябрьскихъ и январскихъ уже сильнѣе, у апрѣльской очень сильна, у августовскихъ же горло и шея кругомъ, гдѣ птицы еще не смѣнили перьевъ, — буровато-рыжія. Бѣлый цвѣтъ оперенія пріобрѣтаетъ иногда розоватый оттънокъ, какъ оказывается изъ наблюдений П. К. Козлова, тоже отъ загрязненія — купанья въ красной пыли; оттънокъ этотъ не имѣетъ слѣдовательно ничего общаго съ розовымъ оттънкомъ у нѣкоторыхъ чаекъ, какъ неправильно