

блѣдными крыльями и лишенными металлическаго блеска махами второго разряда должна называться болѣе старымъ названіемъ *Cr. drouyni* (M. EDW.). Несомнѣнно, что формы эти не тождественны, вопросъ только въ таксономическомъ ихъ значеніи.

OUSTALET¹⁾ въ обширномъ разсужденіи не только приходитъ къ убѣжденію относительно тождества двухъ формъ бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ, но и силится даже доказать, увлекшись своею теоріею, что и всѣ остальные ушастые фазаны (*Cr. auritum* и *Cr. harmani*), за исключеніемъ *Cr. tanchuricum*, представляютъ не болѣе какъ типы индивидуальныхъ варіацій одного вида, которыя онъ аналогизируетъ съ цвѣтовыми разностями *Ibis nippon*, альбатросовъ, дневныхъ хищниковъ и совъ. О формахъ синихъ ушастыхъ фазановъ я скажу ниже въ своемъ мѣстѣ, тутъ же ограничусь бѣлыми.

Матеріаль OUSTALET по этимъ послѣднимъ нѣсколько обширнѣе моего, но къ сожалѣнію этикетированъ, какъ и вся коллекція принца Г. Орлеанскаго и Бонвало, а частью и французскихъ миссіонеровъ въ Сы-чуани, очень не точно; между тѣмъ для рѣшенія вопроса о таксономическомъ значеніи двухъ формъ бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ особенно важны точныя мѣстонахожденія. Дальнѣйшія мои разсужденія будутъ основаны на все-же нѣсколько сомнительномъ допущеніи, что мѣстонахожденія всѣхъ приведенныхъ OUSTALET экземпляровъ вѣрны. Вопросъ сводится къ тому, распространены ли обѣ формы, *Cr. tibitanum* и *Cr. drouyni*, по всей области, занятой бѣлыми ушастыми фазанами, или области распространенія ихъ различны хотя бы отчасти, т. е., встрѣчаясь вмѣстѣ въ извѣстной мѣстности, формы эти исключаютъ другъ друга въ другихъ мѣстностяхъ. Подробное разсмотрѣніе всѣхъ извѣстныхъ мѣстъ добычи бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ приводитъ меня именно къ послѣднему выводу.

Всѣ экземпляры, добытые экспедиціей П. К. Козлова къ сѣверу отъ Чамдо, относятся къ *Cr. drouyni*.

Изъ 23 бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ, перечисляемыхъ OUSTALET, происхожденіе одного, типа *Cr. drouyni*, какъ мы видѣли, неизвѣстно; два, оба несомнѣнные *Cr. drouyni*, добыты 4. V. 1890 въ Djala, къ сѣверо-западу отъ Чамдо и чуть къ западу отъ Rutchi, который расположенъ на одномъ изъ правыхъ притоковъ верхняго Меконга; два, считаемые OUSTALET за переходныхъ къ синимъ ушастымъ фазанамъ (pp. 74—75), а мною тоже за *Cr. drouyni*, 17. IV. 1890 въ Tioungou въ двухъ переходахъ къ востоку отъ So (или Sok) въ системѣ верхняго теченія Салуэна; три, именно

1) Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, pp. 67—77.