

дѣлы варіацій одного и того же вида, у котораго окраска рулей измѣняется отъ сплошь черной до бѣлой съ чернымъ, махи 1-го разряда отъ темно-бурыхъ до чисто-бѣлыхъ и махи 2-го разряда отъ украшенныхъ металлическимъ блескомъ до лишенныхъ его, я нахожу однако на основаніи всего вышесказаннаго о географическомъ распредѣленіи двухъ формъ пока еще преждевременнымъ рѣшать этотъ вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ и предпочитаю отложить рѣшеніе его до того времени, когда окончательно выяснится, что *Gr. tibetanum* встрѣчается и въ остальныхъ мѣстахъ области распространенія бѣлыхъ ушастыхъ фазановъ.

Синонимика и литература двухъ формъ будетъ по моему мнѣнію слѣдующая:

### *Crossoptilon tibetanum* (HODGS.) 1838.

- Phasianus (Crossoptilon) tibetanus* HODGSON, Journ. As. Soc. Bengal, VII, 1838, p. 864, pl. 46; Ind. Rev., III, 1839, p. 593, pl.
- Crossoptilon tibetanum*, HODGSON in GRAY'S Zool. Misc., 1844, p. 85; SCLATER, List of Phasianidae, p. 6, pl. 4 (1863); GRAY, List Gallinae Brit. Mus., p. 31 (1867); DAVID, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, VII, 1871, Bull., p. 11; ELLIOT, Mon. Phas., I, pl. 14 (1872); DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 407 (1877; part., non tab. 107); HUME, Str. Fetah., VII, 1878, p. 426; SCULLY, Str. Feath., VIII, 1879, p. 343; OUSTALET, Ann. Sc. Nat., Zool., (7) XII, 1892, p. 315 (part.); SEEBOHM, Ibis, 1893, p. 250; OGILVIE GRANT, Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 293 (1893, excl. synonym. ad. *Cr. drouyni* part.); OUSTALET, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, p. 67 (partim!); DAVIES, Ibis, 1901, p. 409.
- Crossoptilon leucurum* (lapsu!) SEEBOHM in BOWER, Diar. Journ. across Tibet, pp. 182, 296 (1894).
- Crossoptilon auritum* (non PALLAS) GRAY, Gen. B., III, p. 495, pl. CXXV (1845); Cat. coll. Hodgs. Nepal, ed. I (1846), p. 124.
- Crossoptilon tibetanus* GRAY, Hand-list B., II, p. 259 (1870).
- Crossoptilum tibetanum* HUME et MARSHALL, Game B. Ind., I, p. 115, pl. (1878); SEEBOHM, Ibis, 1891, p. 378; OATES, Cat. Birds Eggs Brit. Mus., I, p. 53 (1901).

### *Crossoptilon drouyni* M.-EDW. 1868.

- Crossoptilon drouynii* MILNE-EDWARDS, Compt. Rend. Acad. Sc. 1868, séance 20 août; J. VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, IV, 1868, p. 85, pl. 3 (fig. optima); SWINHOE, Proc. Zool. Soc. Lond., 1871, p. 399; ELLIOT, Mon. Phas., I, p. XVIII, pl. 15 (1872); DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, pl. 107 (1877).
- Crossoptilon tibetanum* (non HODGS.) DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 407 (1877, part.). OUSTALET, Ann. Sc. Nat., Zool., (7) XII, 1892, p. 315 (part.); Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) VI, 1894, p. 67 (part.); SEEBOHM in BOWER, Diar. Journ. acr. Tibet, pp. 178, 235, 294, 295 (1894, lapsu!).
- Crossoptilon leucurum* SEEBOHM, Bull. Brit. Orn. Club, I, 1892, p. XVII; Ibis, 1893, p. 250; OGILVIE GRANT, Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 294 (1893).

Экспедиція нашла *Cr. drouyni* какъ въ системѣ верхняго Меконга, такъ и въ области правыхъ притоковъ верхняго теченія Голубой рѣки. Впервые онъ былъ встрѣченъ 29 августа 1900 въ урочищѣ Рамъ-да на