

Область распространения *Cr. auritum* охватывает собою Алашанскій хребетъ, восточную оконечность Нань-шаня, прилежащую къ нему часть верхняго теченія Желтой рѣки какъ въ предѣлахъ Гань-су, такъ и въ сосѣдней части Тибета, и наконецъ область лѣвыхъ притоковъ верхняго теченія Голубой рѣки въ предѣлахъ самой сѣверной части Сы-чуани. Она не распространяется ни въ Южно-Кукунорскій хребетъ, ни въ область истоковъ Желтой рѣки, ни на самое верхнее, лежащее уже въ Камѣ теченіе Голубой рѣки, ни въ центральную Сы-чуань, ни въ Шень-си, ни въ Хубэй. Подъ восточнымъ Куку-норомъ у DAVID'a слѣдуетъ разумѣть южную часть провинціи Гань-су, но никакъ не Кукунорскій массивъ, гдѣ *Cr. auritum* не встрѣчается. Въ Ала-шанѣ его открылъ Пржевальскій. Онъ же наблюдалъ и собиралъ этотъ видъ въ бассейнѣ рѣки Тэтунга въ Нань-шанѣ, гдѣ впоследствии доказала его для болѣе сѣверной мѣстности, бассейнъ Бабо-хэ, экспедиція братьевъ Грумъ-Гржимайло. На верхнемъ теченіи Желтой рѣки его собралъ во время третьяго своего путешествія Пржевальскій на рѣкѣ Баба-горги, въ хребтѣ Ревенномъ или Джунарѣ и на рѣкѣ Чурымынѣ, а экспедиція Роборовскаго нѣсколько далѣе къ югу, въ ущельи Юнги-Чюныкъ хребта Амнэ-мачинѣ; это самыя западныя изъ его мѣстонахожденій. Въ самой юго-западной части Гань-су его нашелъ М. М. Березовскій ¹⁾ въ Сигученскомъ и Миньчжоускомъ округахъ, гдѣ онъ обыкновененъ, будучи совершенно не извѣстенъ, съ другой стороны, въ восточной части той же провинціи; къ южной же Гань-су слѣдуетъ относить и указаніе DAVID'a (восточный Куку-норъ). Изъ сѣверо-восточной части Сы-чуани его доставилъ М. М. Березовскій изъ Сунь-нана и приблизительно изъ той же мѣстности онъ былъ полученъ STUAN'омъ ²⁾, именно изъ Tung-rei. Не называя точно мѣстъ добычи, его приводятъ для сѣверо-западной Сычуани MILNE-EDWARDS ³⁾ и DAVID ⁴⁾.

Въ 150 миляхъ, т. е. приблизительно въ 225 километрахъ къ востоку отъ Лхассы, слѣдовательно въ бассейнѣ верхней Брамипутры, живетъ на абсолютной высотѣ приблизительно 6000 футовъ, зимою табунами, другая форма синяго ушастаго фазана — *Cr. harmani* ELWES ⁵⁾ — несомнѣнно самостоятельный видъ, область распространения котораго далеко удалена та-

1) BEREZOWSKI et BLANCHI, Aves Exped. Potanini, pp. 24—25 (1891).

2) Ibis, 1899, p. 298.

3) Compt. Rend. Acad. Sc. Paris, LXX, 1870, p. 538.

4) DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 406, pl. 108 (1877).

5) Ibis, 1881, p. 399, pl. XIII. — OGILVIE GRANT, Cat. B. Brit. Mus., XXII, p. 296 (1893). — СЕЕВОИМ, Ibis, 1893, p. 250.